

신장 비타민
레날민정

일반의약품
분류번호 316
[혼합비타민제(비타민A,D 혼합제제를 제외)]

신부전환자에 있어 비타민의 섭취는 좋은 영양상태를 유지하기 위해 필수적입니다. 그러나 식욕감퇴, 대사의 이상, 그리고 투석시 투석액을 통한 수용성비타민의 손실 등으로 인하여 비타민이 부족해지기 쉬우므로 복합비타민 제제를 추가로 복용하여야 합니다. 레날민정은 신장환자의 1일 비타민 권장량을 기준으로 하여 처방된 비타민 B,C 복합제로서 투석환자, 만성신부전에 의한 질소혈증환자에 가장 이상적인 비타민 공급제입니다.

원료약품의 분량 (1정중)

피리독신염산염(KP)	10.0mg
티아민질산염(KP)	1.5mg
시아노코발라민1000배산(KP)(시아노코발라민으로서 6.0μg)	6.0mg
리보플라빈(KP)	1.7mg
아스코르브산(직타용)(별규)(아스코르브산으로서 60.0mg)	61.86mg
폴산(USP)	1000.0μg
비오틴(USP)	300.0μg
니코틴산아미드(KP)	20.0mg
판토텐산칼슘(KP)	10.0mg

첨가제(타르색소) : 황색203호, 황색5호

성상 이 약은 노란색의 타원형 필름코팅정입니다.



효능·효과 투석환자, 만성신부전에 의한 질소혈증환자의 비타민 B, C 보급

용법·용량 성인 : 1일 1회 1정을 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 경고
비타민 B12 결핍에 의한 악성빈혈에 폴산을 사용하는 경우 부분적으로 혈액학적 증상을 호전(나아짐)시킬 수 있으나 신경학적 증상을 악화시키므로 비타민 B12 결핍성 악성빈혈에는 사용하지 않습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분들의 과민반응 환자
 - 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
레보도파
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다.
- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

- 2) 고수산노증(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 환자
- 3) 임부·수유부
- 4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지합니다.
 - 1) 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 위부불쾌감, 위부팽만감, 복부(배부분)팽만감
 - 2) 알레르기성 과민증상
 - 3) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성
 - 4) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)
 - 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응
 - 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상
- 6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 의사의 지시에 따라 복용합니다.
 - 2) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 4) 임상검사치에의 영향
 - (1) 각종 요검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
 - 3) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.
 - ※ 제품 개봉 또는 취급시에 포장재(케이스, PTP[알루미늄호일지])로 인하여 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
 - ※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
 - ※ 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 60정

○ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
○ 이 설명서는 2016년 5월 20일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우로27길 2
공장 경기도 안성시 공단1로 25
소비자상담실 : (전화)080-022-1010(수신자부담)