

귀농론계 항균제

에펙신[®] 점안액

(오플록사신)

전문 의약품

분류번호

131
(안과용제)

에펙신점안액은 세균성 안질환에 사용되는 항균 점안액으로서 각막염, 결막염 등의 주요 원인균인 연쇄구균, 포도구균, 인플루엔자균, 모락셀라속 등을 포함한 그람양성균 및 그람음성균에 대해 광범위한 항균효과를 나타내어 각종 외안부 감염증에 뛰어난 치료효과를 나타냅니다.

원료약품의 분량 (1mL중)

오플록사신 (USP) 3.0mg
첨가제: 염화나트륨, 염산, 수산화나트륨, 주사용수

성상

이 약은 미황색-담황색의 등명한 액입니다.

약리작용

1. 에펙신 점안액은 포도구균, 연쇄상구균 등의 그람양성균 및 음성균에 대해 광범위한 항균 효과를 나타내어 각종 세균에 의한 안질환에 뛰어난 치료효과를 나타냅니다.
2. 여름철에 주로 유행하는 세균성 각막염, 결막염 등의 각종 안질환에 우수한 치료효과를 나타냅니다.
3. 점적후 4시간이 지난 후에도 누액중의 농도는 항균활성을 나타낼 정도로 높게 유지되므로 1일 2~3회 투여만으로도 충분한 약효를 나타냅니다.

효능·효과

〈유효균종〉

이 약 감수성의 포도구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 장구균속, 소구균속, 모락셀라속, 간균속, 클렙시엘리속, 세라치아속, 프로테우스속, 모르가넬라 모르가니, 프로비덴시아속, 혈호균속 [인플루엔자균, 헤모필루스 애집티우스 (Koch-Weeks bacillus)], 슈도모나스속, 녹농균, 박출데리아 세파시스, 스테노트로포모나스 (산도모나스)알토필리아, 아시네토박터속, 프로피오니 박테리움아크네스

〈적응증〉

안검염, 누농염, 맥립종, 결막염, 검판선염, 각막염 (각막궤양을 포함), 안과 수술 전후의 무균화 요법

용법·용량

1회 1방울 1일 3회 점안합니다. 증상에 따라 적절히 증감합니다.

수술후 감염증 : 수술전 2일간 1일 5회 점안, 수술 당일에는 수술의 시각, 수술의 종류에 따라 적의 점안하고 수술 직후에 1회 점안, 이후는 포대교환시 매회 점안하십시오.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약 및 귀농론계 항생물질에 과민증 병력이 있는 환자.
2. 부작용
 - 1) 속 : 드물게 속양 증상 (구역, 사지냉감, 호흡곤란 등)이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
 - 2) 과민증 : 드물게 심혈관계 허탈, 의식소실, 혈관 부종 (인두, 후두, 얼굴), 기도폐쇄, 호흡곤란, 발진, 두드러기, 가려움증, 안검발적·부종, 피부발적, 결막출혈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지 하십시오.
 - 3) 눈 : 때때로 일시적인 작열감 등 자극감, 불쾌감이 때때로 자통, 발적, 소양감, 화학적 결막염 및 각막염, 안구주위 및 안면부종, 이물감, 눈 부심, 시력불선명, 눈물, 건조감, 안통, 드물게 어지러움, 비만성 표중각막염 등의 각막장애 및 독성표피 괴사로까지 악화되는 스티븐스-존슨 증후군이 일어날 수 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하십시오.
 - 4) 기타 : 청각장애, 때때로 지극중상이 일어나는 경우가 있습니다.
3. 일반적 주의
 - 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지 하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여하십시오.
 - 2) 이 약의 장기 사용은 진균을 비롯한 비감수성균의 과잉 성장을 초래할 수 있으므로 장기 사용 하지 않습니다. 종복 감염시 투여를 중지하고 다른 요법으로 대처하십시오.
4. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
 - 2) 수유부에 투여할 경우에는 수유를 중단하거나 이 약의 투여를 중지합니다.
5. 소아에 대한 투여
 - 1세 미만의 영아에 대한 안전성 및 유효성이

※5030226-1140430

ILDONG

확립되어 있지 않습니다.

6. 적용상의 주의

- 1) 점안용으로만 사용합니다.
- 2) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의합니다.
- 3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

5mL / 1병, 20병

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2014년 4월 30일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지 (www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사 :

삼천당제약주식회사

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 71

제조외회사 :

일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우막로27길2 (전화) 02-526-3114

공장: 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※ 5030226-1140430

ILDONG