

위염, 위산과다에— 암포젤정

(건조수산화알루미늄겔)

일반의약품

분류번호

234
(제산제)

속쓰림의 가장 큰 원인은 위산과다입니다. 대개는 과음, 과식, 스트레스, 흡연, 약물중독 등이 원인이 되어 위산이 과다하게 분비되고, 이 위산이 위벽을 자극하면서 상처를 내기 때문입니다. 암포젤정은 과량의 위산을 소화해 알맞게 중화시키며, 궤양 염증부위를 피복 보호함으로써 위산과다, 위·십이지장궤양 및 위염에 우수한 효과를 발휘합니다.

원료약품의 분량 (1정중)

건조수산화알루미늄겔 (KP) 392.0mg
(수산화알루미늄으로서 300mg)

성상 : 흰색의 원형정제



약리작용

○제산효과가 완충적입니다.

암포젤정은 복용후 위내에 확산됨으로써 제산효과를 나타냅니다. 이때의 제산작용은 완전 중화가 아니라 수산화알루미늄겔만의 특이한 완충작용(Buffering) 이므로 항상 소화에 적당한 위내산도를 유지시켜 줍니다. 따라서 중조와 같은 제산제와는 다르게 지나친 중화작용으로 인하여 복용후 다시 과량의 위산을 분비하는 산반동이나 탄산가스발생으로 인한 이차적 위산분비를 일으키지 않습니다.

○피복보호작용을 발휘합니다.

암포젤정은 위장점막을 소화시키는 펩신과 직접 결합하거나 흡착하여 활성을 억제하며, 간접적으로는 위내 산도를 낮추어 펩신의 활성을 가역적으로 조절합니다. 따라서 음식물 소화에는 영향을 주지않고, 위장점막의 자기소화를 방지하므로, 항펩신제를 따로 복용할 필요가 없습니다.

○완화한 수렴작용으로 염증의 치유를 촉진합니다.

암포젤정의 수렴작용은 지나친 위장운동을 완화시켜 위액분비를 감소시키고, 궤양염증부위의 혈관수축 작용과 단백응고작용을 일으켜 피막을 형성하므로 궤양성출혈에 효과적입니다.

○흡착작용으로 깨끗한 위장을 만들어 줍니다.

암포젤정은 위장병 환자에게 흔히 나타나는 장내이상 발효에 의한 유독물질, 가스, 독소, 세균 등을 흡착·배설시키므로 헛배가 부르거나 편안치 못한 위장을 정상으로 만들어 줍니다.

효능·효과

다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위궤양, 십이지장궤양, 위염, 위산과다

용법·용량

성인

수산화알루미늄으로서 1회 300~600mg (1~2정), 1일 3회 식간 (식사 1시간전 또는 식사 2시간 후)에 복용 하십시오.

연령 (나이), 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

투석요법을 받고 있는 환자 (장기투여에 의해 알루미늄 뇌증, 알루미늄 골증이 나타날 수 있습니다.)

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 인산염 결핍환자

2) 신장에 (신장장애) 환자 (장기투여에 의해 알루미늄 뇌증, 알루미늄 골증이 나타날 위험이 있으므로 정기적으로 혈중 알루미늄, 인, 칼슘, 알칼리포스파타제 등을 측정하십시오.)

3. 부작용

1) 소화기계 : 때때로 변비, 드물게 구역, 구토 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감량(줄임), 휴약(복용 중지) 또는 완하제를 병용(함께 복용) 하는 등 적절히 조치하십시오.

2) 장기투여 : 장기투여에 의해 알루미늄 뇌증, 알루미늄 골증이 나타날 위험이 있으므로 신중히 투여 하십시오.

4. 일반적 주의

1) 장기연용(계속 복용)을 하지 않습니다.

2) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용(함께 복용)투여하지 않습니다.

2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH상승에 의해 병용(함께 복용)약물의 흡수 · 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여하십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

100, 1000정

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.

습기, 열, 빛은 약의 효과와 안전성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

○ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2012년 8월 23일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지 (www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사 :

삼남제약(주)

충남 금산군 금산읍 인삼로 77

제조의회사 :

일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 2 (전화) 02-526-3114

공장 : 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)