

퀴놀론계 항균제

에펙신®

안연고
(오픈룩사신)

전문의약품

분류번호 131
(안과용제)

에펙신 안연고는 세균성 안질환에 사용되는 항균 안연고로서 각막염, 결막염 등의 주요 원인균인 연쇄구균, 포도구균, 인플루엔자균, 모락셀라속 등을 포함한 그람양성균 및 그람음성균에 대해 광범위한 항균 효과를 나타내어 각종 외안부 감염증에 뛰어난 치료효과를 나타냅니다.

원료약품의 분량(1g중)

오픈룩사신(USP)3.0mg

첨가제 : 정제라놀린, 유동파라핀, 백색바셀린

성상 : 이 약은 담황색의 안연고제입니다.

약리작용

1. 에펙신 안연고는 혐기성균을 포함한 포도구균, 연쇄상구균 등의 그람양성균 및 음성균에 대해 광범위한 항균효과를 나타내어 각종 세균에 의한 안질환에 뛰어난 치료효과를 나타냅니다.
2. 여름철에 주로 유행하는 세균성 각막염, 결막염 등의 각종 안질환에 우수한 치료효과를 나타냅니다.

효능·효과

〈유효균종〉

이 약 감수성의 포도구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 장구균속, 소구균속, 모락셀라속, 간균속, 클렙시엘라속, 세라치아속, 프로테우스속, 모르가넬라 모르가니, 프로비덴시아속, 헬코박테리아속, 헤모필루스 애집티우스 (Koch-Weeks bacillus), 슈도모나스속, 녹농균, 베클레리아 세파시스, 스테노트로포모나스(산토모나스) 말도필리아, 아시네토박터속, 프로피오니 박테리움아크네스, 트라코마 클라미디아(클라미디아 트라코마티스)

〈적응증〉

안검염, 눈농염, 맥립종, 결막염, 검판선염, 각막염 (각막궤양을 포함), 안과 수술 전후의 무균화 요법

용법·용량

1일 3회 도포합니다. 증상에 따라 적절히 증감합니다.

수술후 감염증 - 수술전 2일간 1일 5회 도포, 수술 당일에는 수술의 시작, 수술의 종류에 따라 적의 도포하고 수술 직후에 1회 도포, 이후에는 포대 교환시 매회 도포합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약 및 퀴놀론계 항생물질에 과민증 병력이 있는 환자

2. 부작용

- 1) 속 : 드물게 속양 증상 (구역, 사지냉감, 호흡곤란 등)이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 과민증 : 드물게 심혈관계 허탈, 의식소실, 혈관부종 (인두, 후두, 얼굴), 기도폐쇄, 호흡곤란, 발진, 두드러기, 가려움증, 안검발적·부종, 피부발적, 결막충혈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 3) 눈 : 때때로 일시적인 작열감 등 자극감, 볼레감, 때때로 자동, 발적, 소양감, 화학적 결막염 및 각막염, 안구주위 및 안면부종, 이물감, 눈부심, 시력불선명, 눈물, 건조감, 안통, 드물게 어지러움, 비만성 표층각막염 등의 각막장애 및 독성표피 괴사로까지 악화되는 스티븐스-존슨 증후군이 일어날 수 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하십시오.
- 4) 기타 : 청각장애, 때때로 자극증상이 일어나는 경우가 있습니다.

※5030225-1120709

ILDONG

3. 일반적 주의

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여하십시오.
- 2) 이 약의 장기 사용은 진균을 비롯한 비감수성균의 과잉 성장을 초래할 수 있으므로 장기 사용하지 않습니다. 중복 감염시 투여를 중지하고 다른 요법으로 대체합니다.
- 3) 트라코마의 경우에는 8주간 투여를 표준으로 하고, 이후의 계속적인 투여에 대해서는 신중히 합니다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 2) 수유부에 투여할 경우에는 수유를 중단하거나 이 약의 투여를 중지합니다.

5. 소아에 대한 투여

- 1세 미만의 영아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않습니다.

6. 적용상의 주의

- 1) 점안용으로만 사용하십시오.
- 2) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의합니다.
- 3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관합니다.
- 3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

저장방법 : 기밀용기, 실온 (1~30℃)보관

포장단위 : 3.5g

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

- 이 설명서는 2012년 7월 9일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.


안연고 사용방법



(그림1)



(그림2)



(그림3)

1. 사용전에 손을 깨끗이 씻어 주십시오.
2. (그림2)와 같은 방법으로 눈꺼풀 안쪽에 가로로 가늘고 길게 (약1cm정도의 길이로) 연고를 짜 넣어 주십시오. 이때 용기의 끝이 직접 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
3. 도포 후에 가볍게 눈을 감고 티슈로 여분의 연고를 닦아 버립니다.
4. 연고를 넣은 직후에 일시적으로 안 보일수도 있으나 염려하지 마십시오.
5. 하루에 한번 사용할 경우에는 취침전에 사용하십시오.

※ 주의사항

1. 투과지 이상의 안약을 사용하는 경우는 5~10분의 간격을 두고 점안해 주십시오.
2. 안약 및 안연고는 성분이 변화되기 쉽고 세균에 오염되기 쉬우므로 청결히 사용하고 보관시에는 빛과 온도에 주의하여 치료가 끝나고 남은 것은 버리십시오.
3. 다른 사람과 같이 사용하지 마십시오.

제조사 한림제약주식회사

경기도 용인시 처인구 영문로 2-27

제조의약사

일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우뚝로27길2 (전화) 02-526-3114

공장: 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실: (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※5030225-1120709

ILDONG