

진해 · 거담제

누코미트 캡슐 200mg
(아세틸시스테인)

NUCOMYT Cap. 200mg
(Acetylcysteine)

누코미트캡슐200mg의 주성분 Acetylcysteine은 자연계에 널리 존재하는 아미노산의 일종인 L-Cysteine의 N-Acetyl 유도체로서 각종 급 · 만성 폐 · 기관지 질환에 있어서 흔히 나타나는 끈끈한 기도점액 물질로 인한 기도폐쇄의 위험성을 감소시켜 주고 기도점액 물질의 과잉 축적으로 인한 각종 병리 증상을 완화시켜 주는 효과적이고 독특한 약리작용을 갖는 객담용해성 거담제이다.

【성분 · 함량】 1캡슐 중

아세틸시스테인(USP) 200mg
첨가제 (타르색소) : 황색203호
동물유래성분 : 유당수화물 (소, 우유)

【성상】

흰색의 내용물이 든 (상, 하) 황색의 경질캡슐제

【약리작용 및 특징】

1. 누코미트캡슐200mg의 기도 점액분해작용은 효소제 및 세척제와는 달리 본제의 주성분인 Acetylcysteine의 화학구조식 중의 Sulfhydryl 기(-SH기)가 끈끈하고 농축된 객담중의 Disulfide 결합(-S-S-)을 파괴시켜 객담의 점도를 낮추어 줌으로써 거담을 용이하게 한다.
2. 누코미트캡슐200mg은 Cysteine 유도체의 객담용해제 중 객담용해 효과가 가장 신속하며, 염증이 수반되는 폐 · 기관지염의 경우에도 객담용해 효과가 저하되지 않으므로 급성 · 감염성 폐 · 기관지염 및 상기도 감염 중의 2차 감염으로 인한 기관지염에 있어서도 객담용해 효과가 가장 뛰어난 제제이다.
3. 누코미트캡슐200mg은 기관지점막 섬모의 객담배출운동 효과를 정상으로 회복시켜주며, 기관지 점막에서의 생리적 활성유효 효과를 나타내는 surfactant의 분비기능을 회복시켜주므로 급성감염성 호흡기 질환 뿐만 아니라 기관지천식 및 기관지확장 등의 만성질환에도 그 효과가 매우 탁월한 제제이다.
4. 누코미트캡슐200mg은 상기도와 연결된 내이(internal ear) 및 비강점막 감염성 질환에도 매우 유효하므로 상기도감염의 후유증으로 오는 급 · 만성 비염 및 중이염 등의 예방과 치료에 매우 적합한 제제이다.

【효능 · 효과】

다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급 · 만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 낭성섬유증

【용법 · 용량】

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 복용한다.

1. 급성질환
성인 : 1회 200mg 1일 3회
소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회
2. 만성질환
성인 : 1회 200mg 1일 2회
소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회
3. 낭성섬유증
소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 위·십이지장궤양 환자
- 3) 2세 미만 영아
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임부 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
- 2) 수유부 : 이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등
- 2) 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등
- 3) 드물게 빈맥, 고혈압
- 4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 호흡곤란

4. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항

- 1) 경구용 항생물질(아목시실린, 세프록심, 독시사이클린, 에리트로마이신, 치타페니콜)과 함께 복용시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다).
- 2) 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 30, 100, 500캡슐

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. (소비자상담실 : 080-850-3611(~2) 수신자부담)

※ 이 제품 설명서 작성일자 (하단에 표시) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.celltrionph.com), 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 문의전화(02-2216-3611(내선:3))에서 확인하실 수 있습니다.

작성일자 C-2015.11.20
관리번호 NUC-11-03

제조의회사 :

셀트리온제약
●CELLTRION
충청북도 진천군 이월면 반지길 47-17

제조사 :

유영제약
YOUNG PHARMACEUTICAL
충청북도 진천군 광혜면 용소2길 33