

말초 혈행 질환 치료제

소맥스정

(칼리디노게나제)

SOMAX Tab.
(kallidinogenase)

【원료약품 및 분량】 1정 중

- 유효성분(동물유래성분) : 칼리디노게나제(돼지췌장)(JP) 50.I.U
- 첨가제(동물유래성분) : 무수유당(건강한 소의 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성아산화규소, 폴리메틸렌글리콜6000, 히프르멜로오스포탈라이트

【성상】

흰색의 원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

【용법·용량】

1일 30-150 I.U.를 3회 분할하여 경구 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 조정한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - ① 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - ② 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용
 - ① 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 미려한 경우에는 투여를 중지한다.
 - ② 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - ③ 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - ④ 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.
3. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

【포장단위】 30정/병, 100정/병, 500정/병

제조회사 : (주)셀트리온제약 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2신단로 82
제 조 자 : (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. (소비자상담실 : 080-850-3611(-2) 수신자부담)

※ 이 제품 설명서 작성일자 (하단에 표시) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.celltrionph.com), 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 문의전화(02-2216-3611(내선:3))에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어보시고 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 측면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

※ 의약품 부작용 발생 시 한국약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다. (의약품 부작용신고 및 피해구제 상담: 1644-6223)

작성일자 2023.05.03
관리번호 8001776-1