

토박신 주사액 (Methocarbamol)

전문 의약품/분류번호:122

원료약품 및 분량 : 1mL 중

주성분 : 메토카르바몰(KP)	100mg
첨가제(안정제) : 아황산수소나트륨(KP)	1 mg
첨가제 : 폴리에틸렌글리콜 300(NF)	0.5mg
염산(NF)	적량
주사용수(KP)	적량

성 상 : 무색 투명한 액이 들어있는 갈색 앰플

효능 · 효과

근골격계 질환에 수반하는 동통성 연축, 요배통증, 경관원증후군, 건관절주위염, 변형성척추증

용법 · 용량

성인 : 메토카르바몰로서 1회 500mg을 근육 또는 정맥주사한다. 1회 1g, 1일 총투여량 3g을 초과하지 않으며 연속적으로 3일을 초과하여 투여하지 않는다. 단, 동통이 지속시 경우에 따라서 48시간후 주의하여 동일과정을 반복할 수 있다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1.경고
앰플 주사제는 용기 절단시 유리 파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의 할 것

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 또는 유사화합물(페로바메이트 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 신장에 또는 신장에가 의심되는 환자
- 3) 중증의 근육력증 환자
- 4) 혼수 또는 전혼수상태 환자
- 5) 뇌손상, 간질 또는 경련의 병력이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 간장애 환자(증상을 악화시킬 수 있다.)
- 2) 아황산수소나트륨이 함유되어 있으므로 아황산 아니필락시와 같은 알레르기 일으킬 수 있으며, 일부 감수성 환자에서는 생명을 위협할 정도 또는 이보다 약한 천식발작을 일으킬 수 있다. 일반 사람에서의 아황산감수성에 대한 총괄적인 빈도는 알려지지 않았으나 낮은 것으로 보이며 아황산감수성은 비천식 환자보다 천식환자에서 빈번한 것으로 나타났다.

4. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 두드러기, 가려움, 드물게 쇼크유사증상 등의 증상이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 순환기계 : 때때로 서맥, 혈압저하 등이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 휘청거림, 운동실조, 두통, 두중감, 졸도, 실신, 드물게 시력불선명 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 한다.
- 4) 소화기계 : 때때로 구역 · 구토, 식욕부진, 가슴쓰림 · 위정체감 · 위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 5) 감각기계 : 때때로 금속성의 미감을 느낄 수 있다.
- 6) 기타 : 발열, 비충혈이 나타날 수 있다.
- 7) 주사부위 : 때때로 동통, 경결, 드물게 혈전성정맥염이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

졸음, 주의력 · 집중력 · 반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

6. 상호작용

- 1) 다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 단독투여하는 것이 바람직하나 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 주의한다. : 페노티아진계 약물(클로르프로미딘 등), 바르비탈계 약물 등의 중추신경억제제, MAO 저해제
- 2) 톨페리손염산염과 병용투여시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에

는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다.

- 2) 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

8. 소아에 대한 투여

영 · 유 · 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어있지 않다.

9. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

10. 임상검사에 대한 영향

요중 5-히드록시인돌초산 및 요중 바닐만델산치를 상승시킨다.

11. 적응상의 주의

- 1) 경구투여가 부적당한 경우에만 주사를 사용한다.
- 2) 정맥주사시에는 생리식염주사액 또는 5%포도당주사액에 혼합하여 사용할 수 있으며, 단독투여할 경우에는 분당 3mL이하의 속도로 직접 정맥에 주사한다.
- 3) 주사시에는 환자를 옆으로 눕어서 투여한다.
- 4) 앰플절단시 유리 미소편의 혼입을 피하기 위하여 에탄올면 등으로 대고 절단하여 사용한다.

저장방법 : 차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

- ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
※ 이 첨부문서 최초 작성일자(1992년 12월 01일)이후 변경된 내용은 “온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)”에서 확인할 수 있습니다.
※ 제품 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품인 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 “소비자피해보상규정” 의거 소비자 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

개정년월일 : 2015년 02월 11일
5016103-V-007