



베아제[®] 정

소화효소제

사용전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 보십시오 사용설명서를 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

베아제는 서구화된 현대인의 식생활 패턴에 맞추어 처방된 다층 혼합정제로 위와 장, 2단계에 걸쳐 소화를 촉진하는 소화제입니다.

소화에 필요한 5종의 소화효소와 위장관내 가스를 제거하는 시메치콘과 인체의 생리적 소화작용을 촉진시켜주는 UDCA가 배합된 소화제입니다.

1. 다층혼합정제로 위와 장에서 2단계 소화작용

- 위에서 작용하는 성분과 장에서 작용하는 성분이 다층으로 혼합된 정제로 효과가 신속
- 7가지 성분이 위에서 한번, 장에서 또 한번 2단계 소화 작용 발휘

2. 소화액 분비 촉진작용

- UDCA가 함유되어 담즙의 분비를 촉진시켜 생리적인 소화작용 촉진

3. 가스제거작용

- 가스제거성분인 simethicone이 함유되어 가스로 인한 소화불량, 소화불량으로 인한 위부팽만감 등을 제거

위에서 작용하는 성분

장에서 작용하는 성분



**위에서 작용하는 성분 :

비오디아스타제2000III, 리파제II, 판푸로신SS, 판셀라제SS, UDCA, 시메치콘

**장에서 작용하는 성분 : UDCA, 판크레아틴

【원료약품 및 그 분량】 -1정 중-

비오디아스타제2000III(KPC)	50.0mg
리파제(KPC)	15.0mg
판푸로신SS(별규)	20.0mg
판셀라제SS(별규)	30.0mg
판크레아틴 장용과립(KPC)	78.6mg
우르소데옥시콜산(KP)	10.0mg
시메치콘(U.S.P.)	40.0mg
첨가제(식약청인정타르색소) : 청색 1호, 황색 203호	

【효능·효과】

소화불량, 과식, 체함(위체), 식욕부진(식욕감퇴), 소화촉진, 소화불량으로 인한 배 팽만감, 만성 위염 및 위장관 수술후에 수반되는 배 팽만감, 비어있는 창자, 공기 삼키기, 구역, 구토, 가스제거

【용법·용량】

성인 1회 1정, 1일 3회 식후 복용합니다.



중세가 심할때에는 의사의 지시에 따라 1회 2정, 1일 3회 복용합니다.

【성 상】

이 약은 연녹색의 장방형 필름코팅정제입니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자분에게는 투여하지 마십시오.
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자분에게는 투여하면 안됩니다.
- 다음 환자분에게는 신중히 투여하십시오.
 - 다른 약물을 투여받고 있는 환자분
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 소아에 대한 투여
 - 이 약은 7세 미만의 영·유아에게 투여하지 마십시오.
- 저장상의 주의사항



【저장방법】 기밀용기

【포장단위】 자사포장단위

【사용기간】 2년

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- ※ 복용전에 포장외부에 있는 내용을 읽은 후 복용하시고 약과 함께 보관하세요.
- ※ 내부포장이 파손되어 있으면, 복용하지 마세요.



주식 **대웅제약**
경기도 화성시 향남읍 상신리 906-10

작성 연월일: 1987.07.15
최종 개정 연월일: 2009.11.07

- ※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.