

[사용상 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 3개월 미만의 젖먹이 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오. 1) 레보도파 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산화이 배설되는 상태) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 4) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 묽은 변 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다. 3) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 4) 폴신이 부족한 환자(예: 비타민B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다. 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고옥살혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 6) 우발적으로 과량복용 한 경우 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오. 3) 각종 요검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다. 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.



제조판매자

유한양행

본사: 서울시 동작구 노량진로 74
공장: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219

홈페이지: www.yuhan.co.kr

소비자상담실: 080-024-1188(수신자 요금부담)

일반의약품

조제용

1,000정



비타민 B 복합제

베이콤 정

<316:혼합비타민제>

Beecom



(01)08806421007039

[원료약품 및 분량] 1정 중

■ 유효성분

티아민염산염(비타민B1)(KP) ----- 6mg
리보플라빈(비타민B2)(KP) ----- 6mg
피리독신염산염(비타민B6)(KP) ----- 1mg
니코틴산아미드(비타민B3)(KP) ----- 25mg
판토텐산칼슘(비타민B5)(KP) ----- 5mg
시아노코발라민 100배산(비타민B12)(별규) ----- 0.1mg
(시아노코발라민으로서 1μg)
아스코르브산과립 97% (비타민C)(별규) ----- 51.6mg
(아스코르브산으로서 50mg)

■ 첨가제: 유당수화물, 인산수소칼슘수화물, 미결정셀룰로오스, 이산화규소, 탈크(활석가루), 스테아르산마그네슘, 스테아르산, 오파드라이 브라운(AMB II 88A665000)

[성상] 적갈색의 원형 필름코팅정

[효능·효과] 다음경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보급: 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하

[용법·용량] 만8세 이상 어린이 및 성인 1회 1~3정, 1일 1회 복용합니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 이 제품은 정부의 "소비자분쟁해결 기준"에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 이 리벨문만 개정일자(2018년 5월 8일) 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우
한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여
부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.



HDPE

무경: PP

SH303560/23



제조번호:

사용기한: