

yuhan

2% Lidocaine HCl · Epinephrine Inj.

1:100,000

분류번호 : 121(국소마취제)

【원료약품 및 분량】 1mL 중

- 유효성분
리도카인염산염수화물(USP) ----- 21.33mg
(리도카인염산염으로서 20mg)
에피네프린타르타르산염(USP) ----- 0.018mg
(에피네프린으로서 0.01mg)
• 첨가제(안정제) : 피로아황산나트륨 1mg
• 기타 첨가제 : 염화나트륨, 주사용수

【성상】 무색 투명한 액체가 충전된 무색의 카트리지식 앰플

【효능·효과】 치과영역에 대한 전달마취, 침윤마취

【용법·용량】

전달마취 또는 침윤마취에 리도카인염산염으로서 6~40mg(0.1약으로서 0.3~2mL)를 사용하며 구강외과 영역에는 리도카인염산염으로서 60~100mg(0.1 약으로서 3~5mL)를 사용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) (경막외마취) 중독한 출혈 또는 속 상태 환자
- 2) (경막외마취) 주사부위 또는 그 주위에 염증 환자
- 3) (경막외마취) 패혈증 환자
- 4) 이 약 또는 기타의 아미드계 국소마취제에 과민증 환자
- 5) 혈관수축제에 과민증 환자
- 6) 고혈압, 동맥경화, 심부전, 갑상선기능항진, 당뇨병, 혈관경련 등의 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) (경막외마취) 중추신경계 질환(수막염, 회백척수염 등) 환자
- 2) (경막외마취) 임신부
- 3) (경막외마취) 고령자
- 4) (경막외마취) 척추에 현저한 변형이 있는 환자
- 5) 할로탄 등의 할로탄 함유 흡입마취제 투여 환자
- 6) 삼환계 항우울약 또는 MAO 저해제 투여중인 환자

3. 부작용

- 1) 속: 속이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 협일저하, 안면창백, 맥박 이상, 호흡억제 등이 나타나는 경우에는 즉시 투여 중지하고 적절한 처치를 합니다.
- 2) 악성고열(표면마취는 제외): 원인불명의 빈맥·부정맥·혈압변동, 급격한 체온상승, 근강직, 혈액의 암적색화(청색증), 과호흡, 발한, 산증, 고칼륨혈증, 미오글로빈뇨(적색뇨) 등을 수반하는 중증의 악성고열이 드물게 나타날 수 있습니다. 이 약 투여중 악성고열에 수반되는 이러한 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 단트롤렌나트륨 정맥주사, 전신냉각, 순(純)산소와의 교환기(過換氣), 산염기평형 시정 등 적절한 처치를 합니다. 또한 이 증상은 신부전을 촉발시킬 수 있으므로 요량유지를 도모해야 합니다.
- 3) 중추신경계
 - ① 진전, 경련 등의 중증의 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 그러한 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여중지하고 디아제팜 또는 초단시간형 바르비탈산 제제(치오펜탈나트륨) 투여 등 적절한 처치를 합니다.
 - ② 졸음, 불안, 흥분, 무시, 어지러움, 구역·구토 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 속 또는 중독한 증상으로 이행하는 것에 주의하고 필요에 따라 적절한 처치를 합니다.
- 4) 과민증: 두드러기 등의 피부증상, 부종 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 드물게 속 또는 중독한 증상이 나타날 수 있으므로 국소마취제 사용시에는 즉시 구급처치를 할 수 있도록 준비해두는 것이 바람직합니다.
- 2) 부작용을 완전히 방지할 수 있는 방법은 없으므로 속 또는 중독한 증상을 피할 수 있도록 다음에 유의합니다.
 - ① 환자의 전신상태를 충분히 관찰합니다.
 - ② 가능한 한 희박한 농도의 것을 사용합니다.
 - ③ 가능한 한 필요최소량을 투여합니다.
 - ④ (침윤·전달마취) 혈관이 많은 부위(두부, 안면, 편도 등)에 주사하는 경우에는 흡수가 빠르므로 가능한 소량을 사용합니다.
 - ⑤ (침윤·전달마취) 주사바늘이 혈관에 들어가지 않음을 확인하여야 합니다.
 - ⑥ (경막외마취) 주사바늘이 혈관 또는 거미막하강에 들어가지 않음을 확인하여야 합니다.
 - ⑦ (경막외·침윤·전달마취) 가능한 천천히 주사합니다.
 - ⑧ (경막외마취) 속 또는 중독한 증상이 나타나는 경우에 신속히 처치할 수 있도록 원칙적으로 미리 정맥을 확보해두는 것이 바람직합니다.
 - ⑨ (표면마취) 기도내 표면마취시에는 흡수가 빠르므로 가능한 소량을 사용합니다.

5. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

6. 고령자에 대한 투여

- 1) 고령자는 이 약에 함유된 에피네프린의 작용에 대한 감수성이 클 수 있으므로 환자의 상태를 관찰하고 신중히 투여합니다.
- 2) 경막외마취를 하는 경우, 고령자에는 일반적으로 마취범위가 넓어지기 쉬우므로 용량에 유의하여 신중히 투여합니다.

7. 적용상의 주의

(표면마취) 안과용으로 사용하지 않습니다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

이 약은 차광하여 실온(1~30℃)에서 보관합니다.

전문의약품

유한

2%염산리도카인·에피네프린주사

1:100,000

【저장방법】 밀봉용기, 차광하여 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 1.8mL x 50앰플

※ 이 제품은 정부의 "소비자분쟁해결 기준"에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 이 문안의 개정연월일(2017.7.18) 이후 변경내용은 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약약품 안전관리원(1644-6223)에 문의 및 신고하시기 바랍니다.

※ 빈 포장재는 분리수거하여 주십시오.

※ 제조번호(LOT), 사용기한(EXP) 등은 아래에 표시되어 있습니다.



제조의뢰·판매자

유한양행

본 사 : 서울시 동작구 노량진로 74
공 장 : 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219

홈페이지 : www.yuhan.co.kr
소비자상담실 : 080-024-1188

제조사

주식회사 휴온스

충청북도 제천시 바이오밸리로 100