

통증부위에 직접 작용하는 파이런스 캡슐



【일반의약품】

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를
주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.



【원료약품 및 그 분량】

1캡슐 중

스코폴라민브롬화수소산염수화물(KP)	100 μ g
파파베린염산염(KP)	20mg
아미노벤조산에틸(KP)	93.33mg
첨가제(타르색소): 적색 3호, 청색 1호	

【성상】

백색의 분말이 든 상의 청색, 하의 백색의 캡슐제

【효능 · 효과】

위통, 복통(배아픔), 산통, 위산과다, 속쓰림

【용법 · 용량】

성인(15세 이상) 1회 1캡슐 1일 3회 복용합니다.

다만, 1일 2회 이상 복용시에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 6세 미만의 영아(갓난아기), 유아
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약으로 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 심장해 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨장애 환자, 허약자 또는 고령자(노인)
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 4) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

3. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 2) 이 약을 투여함으로써 구갈(목마름), 변비의 증상이 나타날 수 있습니다. 또 두통, 안면홍조(얼굴붉어짐), 눈부심, 배뇨장애 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 극약 성분이 함유되어 있으므로 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 이 약을 투여함으로써 시야몽롱, 눈부심 등이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.
- 3) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

5. 상호작용

스코폴리아엑스를 함유하는 제제 및 다른 위장진통 · 진경(경련 멈춤)제와 병용(함께 복용)투여하지 않습니다.

6. 소아에 대한 투여

이 약은 6세 미만의 영아(갓난아기), 유아에게 투여하지 않습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사일광(햇빛)을 피하고 되도록이면 (습기가 적은) 서늘한 곳에 (밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】

기밀용기에 넣어 상온에 보관합니다.

【포장단위】

10 캡슐

【사용기한】

외부 포장재에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

【소비자상담】

080-203-6000 (수신자 요금부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성일(2015년 8월 24일)이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지나 소비자보호실 (TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 란을 참조하세요.

코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

최종 개정연월일 : 20150824

 **코오롱제약**