

기침, 가래, 천식

엑스코프 시럽

【일반의약품】

8 806703 010115



X-COUGH Syrup

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고,
첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】

100mL 중

트리메토클로놀염산염수화물 (KP)	10mg
클로르페니라민말레산염 (KP)	20mg
리소짐염산염 (KP)	100mg (역가)
세네가유동엑스 (별규)	1.67mL
첨가제(보존제):	
파라옥시벤조산메틸 (KP)	70mg
파라옥시벤조산프로필 (KP)	30mg

【성 상】

담황색의 시럽제

【효능·효과】

기침, 가래, 천식

【용법·용량】

다음의 1회 용량을 1일 4회, 최대 6회까지 식후 및 취침시에 복용합니다.
복용간격은 4시간 이상으로 합니다.

연 령	1회 용량
성인(15세이상)	10mL
11세 이상 - 15세 미만	6.6mL
8세 이상 - 11세 미만	5.0mL
5세 이상 - 8세 미만	3.3mL
3세 이상 - 5세 미만	2.5mL
2세 이상 - 3세 미만	2.0mL

만 2세 미만 : 의사의 진료를 받습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1)본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
- 2)지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 3)간장애, 신장애(신장장애), 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열 환자, 허약자
- 4)심장에 및 고혈압 환자, 고령자(노인)
- 5)임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 6)녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨장애 환자
- 7)의사의 치료를 받고 있는 환자
- 8)이 약은 카라멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

2. 이상반응

- 1)이 약을 투여함으로써 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움 등이 나타날 경우에

는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.

2) 이 약을 투여함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.

3) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염(입안염) 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상양의 수종 등의 중증(심한증상)의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의합니다. 또한 드물게 이와 같은 중증(심한증상)의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받습니다.

4) 유아에서 이 약에 함유된 리소침염산염을 처음으로 복용했을 때, 속(아나필락시)이 나타났다는 보고가 있으므로 복용 전에 의사 또는 약사와 상의합니다.

3. 일반적주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.

2) 수화 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.

3) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여합니다.

4. 상호작용

다른 진해거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등과 병용(함께복용)투여하지 않습니다.

5. 소아에 대한 투여

만 2세 미만의 영아(갓난아기)는 의사의 진료를 받습니다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 직사광선(햇빛)을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관합니다.

3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관합니다.

【저장방법】

• 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관합니다.

• 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

【포장단위】 100 mL

【사용기한】 외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

【소비자상담】 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성일(2015년 3월 2일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(TEL : 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) '의약품검색' 란을 참조하세요.

최초 작성연월일 : 19970620

최종 개정연월일 : 20150302

❖ 코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45