

제3세대 세파계 항생제

뉴세프 주 1g

(세프트리악손나트륨수화물)

NEWCEF Injection

【분류번호 : 618】

【전문의약품】

【항생물질】

근주용 정주용

■원료약품 및 그 분량 : 1 바이알 중

세프트리악손나트륨수화물 (KP).....1g(역가)

■성상 : 백색~옅은 황색의 분말이 무색투명한 바이알에 든 주사제

■효능·효과

•유효균종

황색포도구균(페니실리나제생성균 포함), 표피포도구균, 폐렴연쇄구균, 스트렙토кок쿠스 피오게네스(그룹A베타용혈성), 스트렙토кок쿠스 아갈락티에(그룹B), 스트렙토кок쿠스 비리단스, 우연쇄구균, 에로모나스, 일칼리게네스, 모락셀라, 카타랄리스, 시트로박터, 엔테로박터(일부군주내성), 대장균, 연성하균균, 인플루엔자균(암피실린 내성균 포함), 파라인플루엔자균, 클레브시엘라페렴균(등), 모락셀라, 모르가넬라 모르가니, 프로테우스 미라빌리스, 프로테우스 볼가리스, 프로비덴시아, 임균(페니실리나제 생성균 포함), 수막염균, 플레지오모나스 시겔로이디즈, 녹농균(일부 군주 내성), 살모넬라장티푸스균 포함), 세라티아K영균(포함), 시겔라, 예르시니아(에르시니아 엔테로콜리타) 포함, 박테로이드(박테로이디즈 프라질리스 일부 군주 포함), 클로스트리듐(클로스트리듐 다이피셀 제외), 푸소박테럼(푸소박테럼 모르티페룸, 푸소박테럼 바룸 제외), 펩토구균, 펩토연쇄구균

•적응증

폐렴, 기관지염 등 호흡기계 감염증/이비인후과 감염증/신장 및 요로감염증, 임질 등 생식기 감염증/폐혈증/수술전·후 감염 예방/골 및 관절 감염증/피부, 상처 및 연조직 감염증/복막염, 담낭염, 담관염 등 위장관 감염증/면역기능저하 환자의 감염증/수막염

■용법·용량

- 성인 및 12세 이상 소아 : 세프트리악손수화물로서 1일 1회 1~2g(역가)을 정맥 또는 근육주사 합니다.
중증질환 또는 중증도의 감염성을 나타내는 병원균에 의한 감염증에는 1일 1회 4g(역가)까지 증량할 수 있습니다.
- 신생아 : 신생아(생후 14일 이내)의 경우 체중 Kg당 20~50mg(역가)을 1일 1회 투여하며 체중 Kg당 50mg(역가)을 초과하지 않습니다. 미숙아와 정상아를 구분하여 투여할 필요는 없습니다.
- 영·유아 및 소아생후 15일~12월 : 체중 Kg당 20~80mg(역가)을 1일 1회 투여합니다. 50kg 이상인 소아에는 성인의 상용량을 투여하여야 하며, 체중 Kg당 50mg(역가)이상을 정맥투여 시는 최소 30분 동안 점적 정맥주사합니다.
- 고령자 : 성인의 용법·용량을 변경시킬 필요 없이 그대로 따릅니다.
- 수막염 : 유아 및 소아의 세균성 수막염의 경우 초기용량은 체중 Kg당 100mg(역가)을 1일 1회 투여합니다. [1일 총 4g(역가)을 초과하지 않습니다]
병원균 및 그에 따른 감수성이 밝혀지는 즉시 그에 따라서 용량을 줄일 수 있습니다.
다음 치료기간이 효과적일 것으로 밝혀졌습니다.
- 수막염균 : 4일 - 인플루엔자균 : 6일 - 폐렴연쇄구균 : 7일
- 임질 : 페니실린 감수성균 및 내성균에 의한 임질치료 시에는 250mg(역가) 단위 근육주사가 권장됩니다.
- 수술 전·후 감염증 예방 : 오염되었거나 오염될 수 있는 외과수술시 수술 후 감염을 방지하기 위해 감염 위험도에 따라서 1~2g(역가)을 수술 30~90분 전 단위 투여하는 것이 바람직합니다. 결정적장수술시 이 약과 5-니트로이미다졸(예를 들면, 오르니다졸)을 각각 별도로 동시에 투여하는 것이 효과적입니다.
- 신장 및 간기능 장애 : 신기능장애 환자에 있어서 간기능이 정상이면 용량을 감소시킬 필요가 없으나 크레아티닌청소율이 10mL/min 이하인 신부전증의 경우 1일 2g(역가)을 초과하지 않습니다.
간장애환자의 경우 신장기능이 정상이면 용량을 감소시킬 필요가 없습니다. 중증신장 및 간부전증이 있는 경우에는 정기적으로 이 약의 혈중농도를 측정해야 합니다. 투석환자의 경우 투석 후 추가투여는 필요 없으나, 투석환자의 배설속도가 감소될 수 있으므로 용량조절의 필요 여부를 결정하기 위해 혈중농도를 측정하여야 합니다.

• 치료기간 : 치료기간은 질병 치유상태에 따라 다르며 대체로 다른 항생물질 투여 시와 마찬가지로 말일이 소실되었거나 병원균 근절이 확인된 후에도 최소한 48~72시간을 더 투여해야 합니다.

〈이 약의 조제법〉

- ① 근육주사 : 이 약 0.25g 및 0.5g은 각각 1% 염산리도카인용액 1, 2mL에 1g은 1% 염산리도카인용액 35mL에 녹여 둔부에 깊숙이 주사합니다. 한쪽 둔부에 1g이상 투여하지 않는 것이 좋으며 리도카인용액에 녹이지 않고 근육주사하면 통증이 나타납니다. 다만, 리도카인 용액은 절대 정맥주사해서는 안 됩니다.

② 정맥주사

이 약 0.25g 및 0.5g을 각각 주사용수 25, 5mL, 1g을 주사용수 10mL에 녹여 2~4분간 천천히 정맥주사합니다. 점적정맥주사 시는 30분 이상 지속해야 합니다. 이 약 2g을 약 40mL의 칼슘을 함유하지 않은 다음 용액을 중의 한 가지에 녹입니다 : 생리식염수 약 0.46% 염화나트륨주사액과 25% 포도당 주사액의 혼합액, 5% 포도당 주사액, 10% 포도당 주사액, 6% 덱스트란용액을 함유한 5% 포도당 주사액, 6~10% 히드록시에틸셀룰로오스 또는 주사용수 등 이 약은 배합금기가 가능하므로 다른 항균 물질이 함유된 용액 또는 상기용액 이외의 희석용액과 혼합하지 않습니다.

■사용상의 주의사항

1경고

- 1) 이 약은 칼슘함용용액 또는 약물과 혼합해서는 안되며, 각각 분리된 주입구일지라도 동시에 투여해서는 안됩니다.
- 2) 이 약을 투여한 후 48시간 이내에 칼슘함용용액 또는 약물을 투여해서는 안됩니다.
- 3) 수액제 등 칼슘함용용액의 정맥투여가 요구되는(예상되는) 신생아<28일>에는 세프트리악손-칼슘 점진 위험이 있으므로, 이 약을 투여해서는 안됩니다.
- 4) 이 약과 칼슘함용용액을 투여 받은 신생아 또는 미숙아의 폐와 신장에서 침전물결에 의한 치명적인 결과가 몇몇 사례에서 보고되었습니다. 이 중 일부의 경우 이 약과 칼슘 함유 용액을 동일한 정맥 주입구로 투여한 경우였으며, 일부 정맥 주입구에서 침전물이 관찰되었습니다. 이 약을 칼슘함용용액의 주입구 및 투여시점과 다르게 투여한 1명의 신생아에서 최소 1건의 치명적인 결과가 보고되었습니다. 이 경우 신생아 부검 시 침전물결은 관찰되지 않았습니다. 신생아 이외의 환자에서는 유사한 보고가 없었습니다.K6 상호작용 및 11측용상의 주의 항 참조.

2 다음 환자에는 투여하지 마십시오

- 1) 이 약 또는 그 부형제에 과민반응이 있는 환자
- 2) 세팔로스포린계 항생물질에 과민반응 환자
- 3) 페니실린계 항생물질에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
- 4) 리도카인 등의 아민로이드계 국소마취제에 과민반응 환자(근육주사에 한함)
- 5) 리도카인을 함유한 이 약을 정맥으로 투여해서는 안됩니다.
- 6) 미숙아 : 이 약은 미숙아의 경우 출생 후 연령 4주 미만(재태기간+출생주수)까지 금기입니다.
- 7) 황달이 있거나 저알부민혈증, 신증이 있는 신생아(처형 빌리루빈 결핵에 장애가 있을 것으로 생각되는 신생아)이 약은 혈청빌리루빈과 결합된 빌리루빈을 때아낼 수 있는 신생아(신생아)의 빌리루빈 뇌병증의 잠재적인 위험을 초래할 수 있습니다.
- 8) 칼슘 함유 용액 또는 약물을 투여 받고 있는 신생아 (세프트리악손-칼슘점진 발생의 위험이 있습니다.)

3 다음 환자에는 신중히 투여하십시오

- 1) 이 약 또는 세파계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나 부득이 투여할 경우에는 신중히 투여합니다.
- 2) 약물 알레르기성 병력이 있는 환자
- 3) 본인 또는 부모 형제가 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기증상을 일으키기 쉬운 체질인 환자
- 4) 중증의 신장에 환자(혈중농도가 장시간 지속되므로 투여량을 감소하거나 투여간격을 두고 투여합니다.)
- 5) 경구투여가 용이하지 않은 환자 또는 비강구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있으므로 프로트롬빈 시간을 측정하거나 필요하면 비타민 K를 투여해야 합니다.)

4 이상반응

이 약에서 가장 흔하게 보고된 이상반응은 호산구증가증, 백혈구감소증, 혈소판감소증, 설사, 발진, 간효소 증가입니다. 임상시험의 결과로 이 약의 이상반응의 빈도가 결정되었습니다. 매우 흔하게(≥1/10, 흔하게(≥1/100, 흔하지 않게(≥ 1/1,000, 드물게(≥1/10,000, (1/10,000), 매우 드물게(1/10,000)로 빈도를 분류하였습니다.

표 1. 이상반응표

신체기관	흔하게	흔하지 않게	드물게	신체기관	흔하게	흔하지 않게	드물게
감염 및 점막		생식기진균감염	위막성대장염	간기능이상	간효소증가		
혈액 및 림프계 이상	호산구증가증, 백혈구 감소증, 혈소판 감소증	과립구감소증, 빈혈, 응고병		피부 및 피하조직 이상	발진	가려움증	두드러기
신경계 이상		두통, 어지러움		신장 및 비뇨기계 이상			혈뇨, 당뇨
호흡기계, 흉부, 종격 이상			기관지연축	전신 이상 및 투여부위 상태		정맥염, 주사부위부종, 발열	부종, 오한
위장관계 이상	설사, 묽은변	오심, 구토		조사(Investigation)		혈중크레아티닌 증가	

- 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 불쾌감, 구내이상감, 현명, 어지러움, 변의, 이명, 발한 등의 증상이 나타나 는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
- 2) 과민반응 : 발진, 두드러기, 홍반, 발적, 가려움, 오한, 발열, 알레르기성 피부염, 부종, 다형성홍반, 아나필락시스 또는 아나필락시스양 반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
- 3) 소화기계 : 드물게 위막성대장염 등의 불편을 수반하는 중증의 대장염이 나타날 수 있습니다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다. 또한 때때로 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 미각이상 드물게 복통, 식욕 부진, 복부팽만감, 소화불량 등이 나타날 수 있습니다. 이 외에 체중감소의 발생이 드물게 나타날 수 있는데, 이들 환자 대부분은 담즙정체나, 담즙배설기를 유발할 수 있는 위험인자 (예: 중증의 질환, 비강구적영양병 등)를 가지고 있었습니다.
- 4) 호흡기계 : 다른 세파계 항생물질 투여 시 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구 증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, 호산구성 폐렴증 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 코르티코이드 투여 등 적절한 처치를 합니다.
- 5) 혈액계 : 호산구 증가, 혈소판 증가, 백혈구 감소, 무과립구증 드물게 빈혈, 용혈성 빈혈, 과립구 감소, 림프구 감소, 혈소판 감소, 프로트롬빈 시간의 연장, 혈청병 등이 나타날 수 있습니다.
- 6) 중추신경계 : 때때로 두통, 어지러움 드물게 조화운동불능, 감각이상 발생할 수 있습니다.
- 7) 피부 : 드물게 중증의 피부 이상반응으로 다형성홍반, 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사증후군이 나타날 수 있습니다.
- 8) 간장 : 때때로 AST, ALT, ALP의 상승, 담낭 중의 세프트리악손-칼슘염 침전으로 인한 증상, 드물게 빌리루빈, 7-GPT의 상승이

- 나타날 수 있습니다.
- 9 신장 : 드물게 급성 신부전 등의 중증의 신장애가 나타났다는 보고가 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다. 또한 당뇨, 혈뇨, 빈뇨(땀)가 생길 수 있습니다. 요도에서 이 약의 침전기 보고되었으며, 대개 고용량에, 80mg/kg/day 또는 총 용량 10g 초과으로 치료된 소아와 다른 위염요인에, 탈수 또는 누워서만 생활하는 등을 가지고 있는 환자에서 보고되었습니다. 이 침전은 무중후성이거나 중후성일 수 있으며 요도폐쇄나 신 후성 급성신부전으로 이어질 수도 있으나 투약을 중지하면 회복됩니다.
- 10 군교대증 : 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있습니다.
- 11 비타민결핍증 : 드물게 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있습니다.
- 12 기타 : 무중, 심실성 기외수축, 혈중 크레아티닌치의 상승, 생식기의 진균증, 발한, 홍조, 심계항진, 코피 등이 나타날 수 있습니다.
- 13 국내 유해사례 : 보고자료(1989-2010년)를 검토 분석한 결과, 다른 의약품에서 발생한 유해사례 보다 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다. · 위장관계 : 클로스트리디움실리실사 · 심혈관계 : 저혈압
- 14 이 약의 시판 후 사용 중 다음과 같은 이상반응이 확인되었습니다. 이 반응들은 불확실한 크기의 모집단에서 보고되었으므로 이 상반응의 빈도를 확립하거나 이 약과의 연관성을 확인하는 것이 항상 가능하지 않습니다.
- 위장관계 증상 : 제장염, 구내염, 설염
 - 혈액학적 변화 : 무구립구증(500/mm³)이 10일 이상 치료 후 총 투여용량이 20g일 때 보고되었습니다.
 - 피부반응 : 급성전신발진농포증(AGEP)와 중증피부이상반응(다형성홍반, 스티븐스-존슨증후군 또는 Lyell증후군/독성표피괴사증) 해가 보고되었습니다.
 - 신장계 이상 : 작란
 - 감염 및 침습 : 군교대증
 - 기타 드문 이상반응 : 담낭 내 세프트리악손칼슘염 중후성침전, 핵황달, 핏몸, 아나필락시스 및 아나필락시스양 반응

5. 일반적 주의

- 1 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료에 필요한 최소 기간만 투여해야 합니다.
- 2 속 등의 반응을 예측하기 위해 충분히 문진하고 사전에 피부반응 시험을 실시하는 것이 바람직합니다.
- 3 속 발성에 대비하여 급급처치(아나필락시스 등) 발생 시 우선 에피네프린을 정맥주사한 후 글루코코르티코이드를 주사합니다. 준 비를 해두고 투여 후에도 환자를 안전한 상태에서 충분히 관찰합니다.
- 4 투여 중 정기적으로 임상검사(간기능, 신기능, 혈액 등)를 실시하는 것이 바람직합니다.
- 5 이 약을 특히 하루에 10시간 투여받는 환자에서 담낭의 초음파 검사 시 세프트리악손칼슘침전물이 관찰되었습니다. 이러한 침전 물은 소아환자에서 나타날 가능성이 높습니다. 이 약 투여 중지 후 침전물은 사라지고 증상이 거의 없습니다. 증상을 수반하는 경 우 보존적인 비 수술요법이 권장되며 환자의 유익성/위험성 평가를 근거로 한 의사의 판단에 따라 투여중단 여부를 결정합니다.
- 6 과량투여 시 혈액투석 또는 복막투석에 의해 이 약의 농도가 감소되지 않습니다. 특정한 해독제는 없고 대증요법을 실시해야 함 니다.
- 7 이 약으로 치료시 운전이나 기계작동 능력에 영향을 끼칠 수 있는 바람직하지 않은 효과에, 현기증등이 발생할 수 있으므로, 운 전 또는 기계작동시 주의하여야 합니다.
- 8 이 약을 투여받은 환자에서 담도폐쇄 유발가능성이 있는 제장염이 드물게 보고되었습니다. 대부분 선행 주치료법, 중증 질환, 완 전 비경구영양법(TPN) 등 담즙 정체, 담즙 슬러지(sludge) 생성 위험이 있는 환자였습니다. 이 약이 담즙 침전 유발인자 및 보조인 자로서 작용한다는 점을 배제할 수 없습니다.
- 9 이 약의 작용 용법 ·용량 범위내에서 신생아, 유아 및 소아환자에 대한 안전성 및 유효성이 확인되어 있으며, 이 약은 다른 세팔 로스포린계 약물과 마찬가지로 혈청 알부민으로부터 빌리루빈을 치환시킬 수 있습니다.
- 10 이 약은 빌리루빈 뇌병증의 위험이 있는 신생아(특히 미숙아)에 사용해서는 안됩니다.
- 11 모든 베타락탐계 항생제와 같이 중대하고 가끔 치명적인 과민반응이 보고되었습니다. 중증 과민반응의 경우, 이 약의 치료는 즉시 중단되어야 하며 적절한 응급처치가 시작되어야 합니다. 치료 시작 전에 환자가 이 약 또는 다른 세팔로스포린제제, 다른 계 열의 베타락탐계 항생제에 과민반응력이 있는지를 확인해야 합니다. 다른 베타락탐계 항생제에 과민반응력이 있는 환자를 치료 할 때 주의를 기울여야 합니다.
- 12 이 약을 포함한 세팔로스포린계 항생제를 투여 받은 환자에서 면역 매개성 용혈성 빈혈이 보고되었습니다. 성인 및 소아의 치 료기간 중에도 중증 용혈성 빈혈이 보고되었으며, 일부는 치명적이었습니다. 이 약 치료기간 중 빈혈이 발생한 경우에는 세팔로스 포린 연과 빈혈을 고려해야 하며, 원인이 밝혀질 때까지 이 약의 투여를 중단해야 합니다.
- 13 이 약을 포함한 거의 모든 항생제에서 Clostridium difficile 관련 설사(CDAD)가 보고되었으며, 그 정도는 경미한 설사에서부터 치명 적인 대장염에 이르기까지 다양하였습니다. 항생제 치료는 경장의 정상세균총을 변화시켜 Clostridium difficile의 과도한 증식을 일 으킵니다. Clostridium difficile은 CDAD를 유발할 수 있는 A독소 및 B독소를 발생시킵니다. 이러한 감염은 항균치료에 불응하거나 결 장 절제가 필요할 수 있으므로, Clostridium difficile 군주에 의해 과생성된 독소는 이환율 및 사망률을 증가시킵니다. 항생제 투여 후 설사가 나타나 모든 환자는 CDAD를 의심해야 합니다. CDAD는 항생제 투여 후 2개월 이상 지난 이후에도 보고되었으며, 환자의 병력을 주의 깊게 확인해야 합니다. CDAD가 의심되거나 확인된 경우에는 Clostridium difficile에 직접적으로 작용하지 않는 항생제는 투여를 중단해야 합니다. 임상적 증상에 따라 적절한 수분 및 전해질 관리, 단백질 보충, Clostridium difficile에 대한 항생제 치료, 수술적 평가를 고려해야 합니다.

6. 상호작용

- 1 유사화합물(다른 세페계 항생물질)과 푸로세미드 등의 이뇨제와 병용투여 시 신장애가 증가될 수 있으므로 신중히 투여합니다.
- 2 이미노글리코사이드계 항생물질과 병용투여에 대한 그람음성균의 실험 연구결과 상가 또는 상승작용이 나타났으며 이 사실은 녹농균과 같은 병원균에 의한 중증 또는 생명을 위협하는 감염증에서 특히 중요합니다. 이들 두 약물은 배합금기이므로 권장량 범위 내에서 따로 투여하여야 합니다. 세팔로스포린과 함께 투여시, 이미노글리코사이드계 항생제에 의한 신장독성이 잠재적으 로 증가하는데 대하여는 상반된 증거가 있습니다. 임상적 사용시 이미노글리코사이드 수준과 신기능을 충실히 모니터링하는 것 이 권고됩니다.
- 3 프로베나이드는 이 약의 배설에 영향을 미치지 않습니다.
- 4 이 약은 일부 다른 세팔로스포린계 항생물질 투여 시 나타나는 에탄올에 대한 불내성 및 출혈과 관계되는 N-메틸티오테트라졸 기를 갖고 있지 않아 알콜과 병용투여 시 디설피람 유사효과는 나타나지 않았습니다.
- 5 시험관내 시험에서 클로람페니콜 및 세프트리악손의 병용투여 시 길항효과가 관찰되었습니다.
- 6 장균제내 이 약의 살균효과를 약화시킬 수 있습니다.
- 7 칼슘과의 상호작용 : 성인 혈장 및 신생아 체대혈장을 이용한 *in vitro* 시험에서, 세프트리악손과 칼슘의 상호작용을 평가하였습 니다. 최대 1mM 농도의 세프트리악손(*in vivo* 시험에서 세프트리악손 2g을 30분간 주입 시 도달하는 혈중 농도를 초과하는 수치임) 을 최대 12mM(4mg/dL)농도의 칼슘과 혼합하였습니다. 칼슘 농도 6mM(24mg/dL) 이상 성인 혈장과 4mM(16mg/dL) 이상 신생아 혈 장에서 세프트리악손의 회수율이 감소하였습니다. 이러한 현상은 세프트리악손-칼슘 침전에 기인한 것으로 보이며, 신생아는 세 프트리악손-칼슘 침전의 위험이 더 높은 것으로 생각됩니다(1. 경고 및 11. 적용상의주의 항 참조).
- 8 이 약과 비타민 K 길항제 병용 시 출혈 위험이 증가할 수 있습니다. 응고 인자를 자주 모니터링해야 하며, 이 약 치료 도중 및 치 료 후 항응고제의 용량을 적절히 조절해야 합니다.
- 9 이 약과 양사크린, 반코마이신, 플루코나졸을 정맥 투여시 화학적 배합금기가 관찰되었습니다.

7. 임부 및 수유에 대한 투여

- 1 이 약은 태반관문을 통과합니다.
- 2 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확인되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성 이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 3 모유로의 이행이 보고되어 있으므로 수유부에는 신중히 투여합니다.

8. 소아에 대한 투여

- 1 신생아 및 미숙아에 대한 안전성은 확인되어 있지 않습니다.
- 2 연구에 의하면 이 약은 다른 세팔로스포린계 항생물질과 같이 빌리루빈을 혈청알부민으로부터 유리시킬 수 있으므로 과빌리루 빈혈증이 있는 신생아, 특히 미숙아에게 투여할 때는 빌리루빈농증 발생 위험 때문에 투여하지 않습니다.

9. 고령자에 대한 투여

고령자인 경우에는 다음과 같은 점에 주의하여 용량 및 투여간격에 주의하는 등 환자의 상태를 관찰하고 신중히 투여합니다.

- 1 일반적으로 생리기능이 저하되어 있어 이상반응이 발현하기 쉽습니다.
- 2 비타민 K 결핍으로 출혈경향이 나타날 수 있습니다.

10. 임상검사에서의 영향

- 1 티ես테스트 반응을 제외한 베네딕트시약, 펠링시약, 클리니테스트에 의한 요당검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의합니 다. 비효소적 요당검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 이 약으로 치료 시 요당검사는 효소적 방법을 써야 합니다.
- 1 이 약은 혈당 모니터링 중 혈당 수치 측정값을 낮출 수가 있습니다. 따라서 각 모니터링시스템의 사용설명서를 따라야 하며 필 요하면 대체 검사 방법을 쓸 수 있습니다.
- 3 직접 침시험 양성이 나타날 수 있으므로 주의합니다.
- 4 다른 항생물질과 같이 갈락토스혈증 시험에서 위양성이 나타날 수 있습니다.

11. 적용상의 주의

- 1 정맥 내 대량투여에 의해 드물게 혈관통, 혈전성 정맥염, 화끈거림, 구역, 구토를 일으킬 수 있으므로 주사액의 조제, 주사부위, 주 사방법 등에 대하여 충분히 주의하고 주사속도는 가능한 천천히 합니다(정맥주사에 한함).
- 2 용해 후 신속히 투여합니다. 특히 글루타치온제제, 고농도의 이미노산류의 보액에 녹여 투여하는 경우에는 주의해야 합니다. 점 적 주사의 경우는 주사용수를 사용하지 않습니다(등장액이 아님).
- 3 침전물이 형성될 수 있으므로, 희석 시 링거액 또는 하트만액 등 칼슘 함유 용액을 사용해서는 안됩니다. 이 약과 칼슘 함유 용 액을 동일한 주입구로 투여한 경우, 세프트리악손-칼슘 침전이 발생할 수 있습니다. Y-site를 통한 비경구 영양액 등 정맥투여용 칼 슘 함유 용액과 이 약을 동시에 투여해서는 안됩니다. (1. 경고 및 6. 상호작용 항 참조)
- 4 이미노글리코사이드계 항생물질과 병용투여 시 같은 주사기내에서 혼합투여하지 않습니다.

12.보관 및 취급상의 주의사항

조제된 용액은 실온에서 6시간 또는 5℃에서 24시간동안 물리적 및 화학적으로 안정하나, 일반적으로 조제직후 즉시 사용하여야 함 니다. 조제된 용액의 색은 농도 및 보존기간에 따라 투명색-황갈색이며, 이러한 세프트리악손의 특성은 이 약의 약효나 내약성에 아 무런 문제가 되지 않습니다.

■저장방법 : 밀봉용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관합니다.

■포장단위 : 1바이알(1g) x 1, 5, 10, 20, 50, 100

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성일(2015년 3월 31일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL : 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※ 온라인 의학도서관(<http://drug.mfds.go.kr/>)의 '의약품검색' 란을 참조하세요.

제조의뢰자 · 판매원 : 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조사 : (주)한국코로세약 충청북도 음성군 대소면 대풍산로 78

최초 작성연월일 : 20020102

최종 개정연월일 : 20150331

코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45