

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관 하십시오.

무증치료제

라미핀 크림

(테르비나핀염산염)

LAMIPIN Cream

일반의약품

라미핀크림 15그램
(01)08806703002318



라미핀크림 30그램
(01)08806703002325



■원료약품 및 그 분량

1g 중	
테르비나핀염산염(JP)	10mg
첨가제(보존제):	
파라옥시벤조산메틸(KP)	1.6mg
파라옥시벤조산프로필(KP)	0.4mg

■성 상: 백색의 크림제

■효능·효과

1. Trichophyton(T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증: 족부백선, 고부백선(대퇴부 백선)(완선(사타구니 백선)), 체부백선
2. Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)에 의한 어루러기
3. 피부칸디다증

■용법·용량

1일 1~2회 환부(질환부의)에 바릅니다.
질환에 따른 치료기간은 다음과 같습니다.

1. 족부백선: 1~4주
지간형 족부백선: 1일 2회 1주
2. 체부백선, 고부백선(대퇴부 백선)(완선(사타구니 백선)): 1~2주
3. 피부칸디다증: 1~2주
4. 어루러기: 2주

치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선(나아짐)되지 않으면 진단을 다시 해야 합니다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 테르비나핀 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유·소아

2. 부작용

피부의 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반, 가려움, 자각감, 국소의 접촉피부염, 피부박리(벗겨짐), 자동(끼르는 것 같은 아픔), 작열감(화끈감)이 적용부위에 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.

3. 일반적 주의

- 1) 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지면 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 2) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 않습니다.
- 3) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균(곰팡이)학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행합니다.
- 4) 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 않습니다.
- 5) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(젖먹이/갓난아기) (표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의합니다.