

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

혈액 순환 개선제

일반의약품

플라본 정

(은행엽엑스)

FLAVONE Tablet

□ 성분 · 함량 : 1정 중

은행엽엑스(KPC) 40mg

(총 강고플라본 배당체로서 9.6mg)

첨가제(타르색소) : 레이크 청색 1호, 황색 4호, 레이크

□ 성상 : 얇은 녹색의 육각형 필름코팅정제

□ 효능 · 효과

1. 주요효과

1) 말초동맥 순환장애(간혈성 파행증)의 치료

2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명

3) 이명, 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

□ 용법 · 용량

• 성인 :

1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명 : 은행엽엑스로서 1회 40mg(1정) 1일 3회 또는 1회 80mg(2정) 1일 2회 경구투여합니다.

2) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80mg(1~2정) 1일 3회 또는 1회 120mg정(3정) 1일 2회 경구투여합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

□ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약에 과민증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 부작용 : 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의 : 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자는 투여하지 않습니다.

5. 임부에 대한 투여 : 동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.

6. 소아에 대한 투여 : 소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않습니다.

7. 저장상의 주의사항 : 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.

□ 저장방법 : • 밀폐용기에 넣어 실온(1~30°C)에 보관합니다.

• 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

※ 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

□ 포장단위 : 12, 30, 60, 120, 300, 500, 1000정

□ 사용기한 : 외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

□ 소비자상담 : 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성일(2009년 4월 16일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

최초 작성연월일 : 20021104

최종 개정연월일 : 20090416

❖ 코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평동 48-5

<http://www.kolonpharm.co.kr>