

포스바인정

(아세트산칼슘)

고인산혈증 치료제

포스바인정

(아세트산칼슘)

PHOSBINE Tablet

■ 원료약품 및 그 분량: 1정 중

아세트산칼슘 (USP) 710mg
(무수물로서 667mg)

■ 성상: 백색의 원형 정제

■ 효능·효과: 말기 신부전 환자의 고인산혈증

■ 용법·용량

- 초기용량: 매 식사중 2정씩 경구로 복용합니다.
- 유지용량: 고칼슘혈증을 유발하지 않는 상태에서 혈중 인산의 농도가 6mg/dl 이하가 될때까지 용량을 점차 증가시킵니다.

통상, 식사중 3~4정을 경구로 복용합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
· 고칼슘혈증 환자

2. 부작용

고칼슘혈증을 유발할 수 있으며, 경증의 고칼슘혈증($Ca > 10.5mg/dl$)은 무중상이거나 변비, 식욕부진, 오심, 구토를 일으킬 수 있으며, 중증은 착란, 지각탈실, 혼수 등을 일으킬 수 있습니다. 경증일 경우는 복용량을 줄이거나 복용을 중지하고, 중증일 경우는 복용을 중지하고 혈액투석을 실시합니다.

3. 일반적 주의

- 1) 이 약의 복용량은 초기에 결정하여 필요에 따라 조정합니다.
- 2) 이 약의 과량 투여는 고칼슘혈증을 유발할 수 있으므로, 용량을 결정하는 치료 초기단계에 혈중 칼슘농도를 1주일에 2회 측정합니다.
- 3) 고칼슘혈증은 심부정맥을 촉진할 수 있기 때문에 디기탈리스를 투여하는 환자에게는 이 약을 투여하지 않습니다.
- 4) 혈중 인산농도는 정기적으로 측정하여야 합니다.
- 5) 비처방된 제산제의 복용을 피합니다.
- 6) 인산과 결합된 혈중칼슘은 66을 넘지 않아야 합니다.

4. 약물 상호작용

이 약은 테트라사이클린의 생물학적 활성을 낮출 수 있습니다.

5. 임부 및 소아에 대한 투여

- 1) 이 약을 투여하여 실시한 동물시험에서는 최기형성이 나타나지 않았으나, 임부에게 투여할 경우에는 유익성이 위험성을 상회할 경우에만 투여합니다.
- 2) 소아에 대한 안전성과 유효성이 아직 확립되어 있지 않습니다.

6. 기타

고칼슘혈증의 증상을 환자에게 인지시켜 주의하도록 합니다.

■ 저장방법: 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관

■ 사용기한: 외포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■ 포장단위: 30, 500정

■ 소비자상담: 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성일(2015년 7월 17일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※ 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'란을 참조하세요.

코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문정서로 18번길 45

최초 작성연월일: 19981007

최종 개정연월일: 20140717

코오롱제약