

제일 티아민염산염 주사액

(Thiamine HCl Injection)

【※ 구제품명 : 염산치아민주사액】

【분류번호 312 : 비타민 B₁제】**【원료약품 및 그 분량】** 1mL 중

티아민염산염 (K.P.)	25mg
벤질알코올 (K.P.)	적량
주사용수 (K.P.)	적량

【성상】 무색 투명한 액이 든 갈색 투명한 앰플주사제**【효능·효과】**

- 비타민 B₁ 결핍증의 예방 및 치료
- 비타민 B₁의 수요가 증대하여 식사로부터의 섭취가 불충분한 경우의 보급 소모성 질환, 갑상선기능항진증, 임신부, 수유부, 심한 육체노동 시
- 베르니케뇌병증
- 각기
- 다음 질환 중 비타민 B₁ 결핍 또는 대사장애가 판여한다고 추정되는 경우
 - 근육통·관절통
 - 신경통, 말초신경염·말초신경마비
 - 심근대사장애

【용법·용량】

경구투여가 어려울 경우, 고용량 투여 또는 위급한 상황에 한하여

성인 : 티아민염산염으로서 성인 1일 1~50mg을 피하, 근육 또는 정맥주사 한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
 - 앰플 주사제는 용기절단 시, 유리파편이 혼입되어, 이상반응을 초래할 수 있으므로 사용시, 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단, 사용하되 특히 어린이, 노약자에 사용 시는 각별히 주의한다. (앰플제에 한함).
 - 벤질알코올은 미숙아에게서 치명적인 가쁜 호흡증상과 연관이 있는 것으로 보고되었다.
- 다음 환자에게는 투여하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자(심각한 과민반응으로 정맥주사 후 사망 보고가 있다. 과민반응이 의심되는 사람에게는 피부검사를 권할 수 있다.)
 - 신생아, 미숙아 (벤질알코올을 함유하고 있다.)
- 이상반응
 - 주로 반복 정맥주사 후 드물게 허탈, 사망이 보고된 바 있으므로, 흉통이나 호흡곤란 등의 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 발열, 가려움, 두드러기, 무기력함, 발한, 구역, 청색증, 호흡기부종, 위장관출혈 등이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 비타민 B₁ 결핍은 다른 비타민과 관련되어 있을 경우가 많으므로 복합비타민 결핍증을 고려해야 한다.
 - 비타민 B₁ 결핍 또는 대사 장애가 판여한다고 추정되는 경우에 한하여 효과가 없는 경우 1개월 이상 사용하지 않는다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 실온에서 차광하여 보존한다.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용에 의한 사고 발생이나 의약품의 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【포장단위】 2mL/앰플 × 자사포장단위**【저장방법】** 차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관**【사용기한】** 제조일로부터 36개월

■ 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 약국, 병원, 의원 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 본사 영업부에서 교환하여 드립니다.



(주) 제 일 제 약
대구광역시 달서구 성서로 18-29
(성서공단 2차단지 2지구 648 2L)
TEL. (053) 583-6226-8
FAX. (053) 583-5775

• 작성년월일
1994. 3. 30
• 개정년월일
2013. 3. 4

이 첨부 문서 작성일자 (2013년 3월 4일) 이후 변경된 내용은
<http://www.jeilphar.co.kr> 나 (053) 583-6226-8에서 확인할 수 있습니다.