

원료약품의 분량 : 1정 (260mg) 중
 센나열매가루(BP).....60mg
 센나열매가루(KPC).....20mg
 센나열매엑스(별규).....25mg
 비사코딜(KP).....5mg

유당수화물(KP).....86.25mg
 착색제 : 황색4호, 청색1호(KPTaCS).....적량
 성상 : 연녹색 원형의 장용성 필름코팅정
 효능·효과 : •변비 •변비에 따른 다음 증상의 완화
 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

KGMP우수약품 제조적격업체 | 일반의약품 | 분류번호 : 238

생약성분의 안전하고 편안한 변비약

비카린^정

20정



▶ 변비치료 ▶ 장내이상발효
 ▶ 복부팽만 ▶ 식욕감퇴 ▶ 치질



용법·용량 : 성인 1회 1~2정 1일 1회 취침시
 에 복용한다. 다만, 초회(처음)는 최소량을 복
 용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증
 량 또는 감량한다.

생약성분의 안전하고 편안한 변비약
비카린^정

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐
 색(장마힘) 환자 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락
 토오스 불내성(Galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효
 소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡
 수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제
 가 있는 환자에게는 투여(복용)하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 심한 복통 또는 구역, 구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을
 가능성이 있는 부인 3) 수유부 4) 다른 약물을 투여(복용)받고 있
 는 환자

3. 부작용

1) 이 약을 투여함으로써 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타날 경우
 에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다. 2) 고용량 또
 는 만성적인 투여로 인해 전해질(특히 칼륨)의 손실이 올 수 있다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 반드시 필요한 경우 이외에는
 10세 이하의 소아에는 투여(복용)를 피하는 것이 바람직하다. 3) 자극
 성 완화제는 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비
 가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안된다. 만약
 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사하여야 한다.

5. 상호작용

강심배당체와 병용투여(함께복용)시 하제(설사약)의 만성적 투여
 (복용)에 의해 칼륨결핍으로 강심배당체의 작용이 증강될 수 있다.

6. 소아에 대한 투여

이 약은 7세 미만의 영·유아에게 투여(복용)하지 않는다.

7. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고
 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아)
 보관한다. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른
 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기간 : 제조일로부터 36개월 **포장단위** : 자사포장단위

제조원 : 이주아남제약 경북 경산시 진량읍 신상리 1204

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라
 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경
 과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신
 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성일자(2011.11.24)이후 변경된 내용이나 제품에 대한 기타
 자세한 사항은 본사(053)851-7760로 문의하시거나 또는 이지드
 렉(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)-(정보마당)-(의약품등정보)에서 확
 인할 수 있습니다.

개정일 : 2011년 11월 24일