

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 용기의 기재사항을 확인하십시오.

【유효성분】1정 중

트리메부틴말레산염(KP) ... 100mg

【효능·효과】

1. 주효능 효과 1) 식도역류 및 열공(구멍, 틈새)헤르니아(탈장), 위 십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토) 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장 3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사)

【용법·용량】

성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100-200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다(복용한다). 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 이상반응 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름), 구내(입안)마비감 등이 나타날 수 있다. 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다. ➡

3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다. 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다. 5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

2. 임부에 대한 투여 임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

3. 수유부에 대한 투여 수유 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유 중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기한】 케이스 측면 표기일까지

【첨가제】 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 흰색의 원형 정제 【포장단위】 10정/피티피