



위 · 장 관 기 능 조 절 제

크로부틴 정


(트리메부틴말레산염)

일반의약품	
의 약 품	239
분류번호	기타의 소화기관용약

【성분 · 함량】 1정 중

트리메부틴말레산염(KP).....100mg

【성상 및 성분조성】 백색의 원형정제



【약리작용】

1. 소화관운동에 대한 작용
 - 규칙적인 위운동을 유지시켜주고, 저하된 위운동기능을 항진시켜줍니다.
 - 소화관의 연운동을 유발합니다.
 - 위 내용물의 배출을 촉진시켜줍니다.
 - 소화관 평활근에 직접 작용하여 이상 수축을 억제합니다.
2. 말초성 진통작용 : 여러가지 원인에 의한 구토유발을 억제합니다.
3. Rat를 이용한 비임상시험에서 300mg/kg을 십이지장에 투여함으로써 위액분비량의 억제가 인정되었습니다.

【효능 · 효과】

1. 주요효능

- 1) 식도역류 및 열공(구멍)헤르니아(탈장), 위 · 십이지장염, 위 · 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관(창자)통과장애(변비, 설사), 동요(안절부절) 자극, 수면장애

【용법 · 용량】

성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여합니다.
(복용합니다.)

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 부작용

- 1) 소화기계: 드물게 변비, 설사, 복명(창자가가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름), 구내(입안)마비감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계: 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계: 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
- 4) 간 장: 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.
- 5) 과민증: 드물게 발진등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 상온보관(15~25℃)

사용기간 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10정, 1000정(조제용)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 주의

1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법 · 용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831

최초개정년월일: 2013. 03. 19

작성년월일: 2013. 03. 28



대우제약(주)

서울특별시 서초구 남부순환로 2495 원림빌딩 (사초동)
부산광역시 사하구 다대로 153(신평동)

※ 이 첨부문서 작성일자(2013년 3월 28일)이후 변경된 내용은 <http://www.daewoopharm.com>나 051-204-3831(대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.