



우수의약품지정업체

광범위 호흡기질환 치료제

비브락스

시럽

(암브록솔염산염, 클렌부테롤염산염)

전문약품

의약품	222
분류번호	진해거담제

비브락스는 매연, 흡연, 유해가스 등으로 인한 호흡기질환이나 감기로 인한 급·만성기관지염, 기침, 가래, 천식 등에 유효한 호흡기질환 치료제입니다.

비브락스는 기관지점막 상피세포의 섬모운동을 촉진하여 신속한 거담효과를 나타내며, β_2 -수용체에 선택적으로 작용하여 기관지확장 작용을 나타내어 기관지의 경련성 수축을 이완하고, 기관지점막 분비를 용이하게 해줍니다.

【성분·함량】 100ml 중	
암브록솔염산염(BP).....	150mg
클렌부테롤염산염(BP).....	0.1mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(KP).....	80mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필(KP).....	20mg

【성상】 무색의 체리향이 나는 시럽제

【효능·효과】
다음 질환에서의 기관지 경련 및 점액과다분비 : 기관지천식, 폐기종, 기관지염

【용법·용량】
1) 성인 및 소아(12세이상) : 1회 20ml 1일 2회 복용합니다. 증세가 뚜렷이 호전된 후에는 1회 10ml 1일 2~3회로 감량할 수 있습니다. 심한 호흡곤란 환자는 처음 2~3일간 1회 20ml 1일 3회 복용 할 수 있습니다.
2) 소아(12세미만) : 연령 및 체중에 따라 1회 2.5~15ml 1일 2회 복용합니다.

연령	체중	1회 복용량
6~12세	22~35kg	15.0ml
4~5세	16~22kg	10.0ml
2~3세	12~16kg	7.5ml
8개월~1세	8~12kg	5.0ml
8개월 미만	4~8kg	2.5ml

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
비후성 심근병증 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 감상신기능항진증 환자
 - 고혈압 환자
 - 심부전증, 부정맥 등 심질환 환자
 - 당뇨병 환자
 - 중증 신장애 환자
- 부작용
 - 정신신경계 : 두통, 진전, 근경직, 졸음, 불안, 어지러움, 신경과민, 불면, 흥분, 시지각변각 등이 나타날 수 있다.
 - 순환기계 : 심계항진, 빈맥, 혈압변동, 고혈압, 부정맥 등이 나타날 수 있다.
 - 과민증 : 발진, 가려움, 혈관부종, 두드러기, 기관지경련, 저혈압, 허탈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 기타 : ALT, AST의 상승, 전신권태감, 부종, 위장장애 등이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 과도하게 투여를 계속하는 경우 부정맥 또는 심정지를 일으킬 수 있으므로 충분히 주의한다.
 - 용법·용량에 맞게 투여하여도 효과가 나타나지 않는 경우에는 이 약이 적당하지 않은 것으로 생각하고 투여를 중지한다. 특히 소아에 투여시에는 사용법을 정확히 지도하고 경과를 충분히 관찰한다.
 - β_2 -효능약에 의한 심한 혈청 K치의 저하가 보고되어 있다. 또한 이러한 혈청 K치의 저하작용은 크산틴계 약물, 스테로이드제 및 이노제의 병용에 의하여 악화될 수 있으므로 중증 천식 환자의 경우에는 특히 주의한다. 더욱이 자산소혈증은 혈청 K치의 저하가 심리듬에 미치는 작용을 증강시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 혈청 K치를 모니터링하는 것이 바람직하다.
- 상호작용
 - 이 약을 에피네프린, 이소프로테레놀 등의 카테콜아민류와 병용하면 부정맥 또는 심정지를 일으킬 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
 - MAO저해제나 삼환계 항우울제로 치료중인 환자에게 이 약을 투여하면 이 약의 혈관계에 대한 작용이 증강될 수 있으므로 특히 주의한다
 - 이 약을 프로프라놀롤 등의 비선택적 β -차단제와 병용투여하지 않는다.

뒷면 이어짐▶

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃) 사용기간 : 제조일로부터 24개월

【포장단위】 1000ml

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용 기간이 경과되었거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

- ※ 주의
- 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
 - 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
 - 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
 - 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■제조뢰자 : 대우제약(주) - 부산광역시 사하구 다대로 153 (신평동)

■제 조 자 : 우리들제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

■소비자상담전화 : (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831



대우제약(주)

부산광역시 사하구 다대로 153(신평동)
http://www.daewoopharm.com

최종개정년월일: 2013. 10. 08
작성년월일: 2013. 11. 06

※ 이 첨부문서 작성일자(2013년 11월 6일)이후 변경된 내용은 http://www.daewoopharm.com나 051-204-3831(대우 제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.