



간장질환 치료 및 간기능 개선제

레비셀정


(비페닐디메틸디카르복실레이트)

전문 의약품	
의약품 분류번호	391
간장질환용제	

간장은 2,000여종 이상의 효소를 분비하는 우리 몸의 각종 대사활동을 수행하는 기관으로, 간장수술에 매우 중요한 기관입니다. 즉 해독작용, 영양소의 저장, 활동에너지 생성 및 공급, 소화촉진작용, 면역체생성등 수많은 일을 조용히 수행하는 “침묵의 장기”입니다. 따라서 간 조직의 일부가 병들어 파괴되더라도 주관적으로는 알 수 없기때문에 지나친 음주, 피로, 스트레스, 흡연등으로 간을 혹사시키는 경우가 많습니다. “레비셀”정은 바이러스성 만성간염을 치료하는 최신효율로서 간장의 지질과 산화를 방지하고 간의 microsome 효소계에서 중요한 cytochrom p-450계 효소활성을 유도하여 독성물질들을 불활성화 시켜주는 약리작용을 가지고 있습니다.

【성분·함량】 1정 중

비페닐디메틸디카르복실레이트(별규) 25mg
첨가제(동물유래):유당수화물(소-우유)



Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate는 한방약제로 사용되는 오미자로 부터 단리된 유효성분Schizandrin C의 합성동족체로서 그중 가장탁월한 치료효과와 적은 부작용을 나타내는 화합물입니다.

레비셀 적응영역

바이러스성간염, 알콜중독성간염, 지방간, 약물중독성간염, 간경변등 S-GPT 상승질환

Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate 구조

【성 상】 백색의 원형정제

【약리작용】

1. 간장의 지질과 산화를 억제시킵니다.
2. 간의 microsome 효소계에 중요한 cytochrom p-450계에서 효소활성을 유도하여 독성물질을 무독화시킵니다.
3. 간 손상에 대한 보호작용으로 상승된 SGPT치를 정상으로 내려줍니다.
4. 레비셀정은 aflatoxin B와 다환발암제로 알려진 benzopyrene의 천연변이성을 일부 억제시킵니다.

【효능·효과】

지속적으로 ALT가 상승되어 있는 만성간염 및 약물로 인해 트랜스아미나제(Transaminase)가 상승된 간염

【용법·용량】

성인 : 비페닐디메틸디카르복실레이트로서 1회 25~50mg, 1일 3회 경구투여합니다.
증상에 따라 적절히 증감합니다.

(윗면이아래)

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃) 사용기간 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정, 300정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과 되었거나 유통 과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 주의

1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831



대우제약(주)

부산광역시 사하구 대대로 153 (신명동)
http://www.daewoopharm.com

최종개정년월일:2012. 11. 16
작성년월일:2012. 11. 16

※ 이 첨부서 작성일자(2012년 11월 16일)이후 변경된 내용은 http://www.daewoopharm.com 나 051-204-3831 (대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 만성 활동성 간염 환자
2) 간경변 환자
3. 이상반응
1) 입안마름, 메스꺼움, 피부발진이 일어날 수 있으며, 이러한 이상반응은 항과민약을 병용투여하면 소실된다.
2) 일과성 황달이 나타날 경우도 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용투여하면 소실된다.
3) 드물게 구역과 복부팽만이 발생할 수도 있으나 곧 소실된다.
4. 상호작용
이노신(Inosine)과 함께 투여시에, 재발한 ALT의 상승이 개선될 수 있다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
임부 및 수유부에는 투여하지 않는다.
6. 소아에 대한 투여
소아에는 용량을 감소시켜 투여한다.
7. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
8. 임상경사치에의 영향
치료 중에 다시 ALT가 상승하는 환자는 거의 없다. 투여 중지 후에 ALT는 증가할 수 있으나 이 약의 재투여로 개선된다.
9. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.