



# 중추성근이완제 대우 에페리손정

(에페리손염산염)

전문 의약품

|             |     |
|-------------|-----|
| 의약품<br>분류번호 | 122 |
| 골격근이완제      |     |

**【성분·함량】** 1정 중  
에페리손염산염(KP).....50mg  
첨가제(동물유래):유당수화물(소-우유)

**【성상】** 흰색의 원형의 당의정제

## 【약리작용 및 특징】

1. **대우에페리손정**은 척수 및 상위중추 레벨에 작용하여, 단시납수·다시납수 반사의 억제를 매개하여 근이완 작용을 발휘합니다. 또한 신장반사의 입력계인 근방추의 자발반사를 감소시켜 근력을 저하시키지 않고 근긴장을 완화시킵니다.
2. **대우에페리손정**은 전정신경 내측핵 뉴런의 이상흥분을 억제하여 근긴장 완화작용·혈류증가작용등의 도움으로 뇌혈관장애·해경부척추증에 수반되는 어지러움과 이명을 개선시킵니다.
3. **대우에페리손정**은 뇌졸중환자의 경련성 마비에 대하여 근력을 저하시키지 않고 상하지의 수의운동을 원활하게 해줍니다.
4. **대우에페리손정**은 다른 골격근이완제에서 흔히 나타나는 진정, 최면작용이 거의 나타나지 않고 부작용이 경미하여 안심하고 투여할 수 있는 제제입니다.

## 【효능·효과】

1. 근골격계 질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경견완중후근, 견관절주위염, 요통
2. 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아 급성 척수신경병변, 기타의 뇌척수질환

## 【용법·용량】

성인 : 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여합니다.  
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

## 【사용상의 주의사항】

1. 다음환자에는 투여하지 말 것.
  - 1) 이 약에 과민증환자
  - 2) 중증의 근무력증 환자
  - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
  - 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자
  - 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있다.)
3. 부작용
  - 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
  - 2) 간 장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
  - 3) 신 장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
  - 4) 혈 액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
  - 5) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있다.
  - 6) 정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있다.
  - 7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.
  - 8) 비뇨기계 : 드물게 요폐, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있다.
  - 9) 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신근대강, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있다.
  - 10) 기 타 : 때때로 안면홍조, 드물게 발한, 무중이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
  - 1) 이 약의 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지한다.
  - 2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계작업을 하지 않도록 주의한다.
5. 상호작용
 

이 약의 유사약물인 염산톨페리손과 메토가르바몰을 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
  - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다.
  - 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.
7. 소아에 대한 투여
 

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다. (사용경험이 적다.)
8. 고령자에 대한 투여
 

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

**【저장방법 및 사용기간】** 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)      사용기간 : 제조일로부터 36개월

**【포장단위】** 30정, 1000정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

## ※ 주의

1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831



**대우제약(주)**  
부산광역시 사하구 대대로 153 (신평동)  
<http://www.daewoopharm.com>

최종개정년월일: 2014. 07. 18  
작성년월일: 2014. 08. 14

※ 이 첨부문서 작성일자(2014년 8월 14일)이후 변경된 내용은 <http://www.daewoopharm.com>나 051-204-3831 (대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.