

【성분·함량】 100ml 중

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 페닐레프린염산염(KP).....              | 100mg |
| 클로르페니라민말레산염(KP).....           | 40mg  |
| 첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(KP) .....  | 90mg  |
| 첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필(KP) ..... | 10mg  |
| 첨가제(타르색소): 적색40호(KPTaCS)       |       |

【성상】 딸기향이 있는 담적색의 시럽제

【효능·효과】

1. 감기 또는 알레르기성 및 혈관운동성 비염(코염)에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물
2. 부비동염에 의한 비축혈(코막힘)의 일시적 완화

【용법·용량】

1. 성인(만 12세 이상) : 4시간마다 10ml씩 복용하되, 24시간동안 60ml를 초과하지 않도록 하거나 의사의 지시에 따릅니다.
2. 만 6-12세 소아 : 4시간마다 5ml씩 복용하되, 24시간동안 30ml를 초과하지 않도록 하거나 의사의 지시에 따릅니다.
3. 만 2-6세 이하 소아 : 의사의 지시에 따릅니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자는 복용하지 말 것
  - 1) 아민계 교감신경항진제, 항히스타민제, 기타 이 약의 성분에 과민성인 환자
  - 2) 특이체질 환자
  - 3) 수유부
  - 4) 중증(심한증상)의 고혈압 환자, 중증(심한증상)의 관상동맥질환 환자, MAO 저해제 치료를 받고 있는 환자
  - 5) 혈우각성 녹내장, 뇨저류(소변이 고임), 소화성궤양, 천식, 폐기종 만성폐질환, 숨이 차거나 호흡곤란이 있는 환자
  - 6) 진정제, 신경안정제를 투여받고 있는 환자
2. 다음 경우에는 신중히 복용할 것  
만성 기관지염 등의 호흡곤란, 심질환, 고혈압, 감작선기능질환, 당뇨병, 녹내장, 전립선(전립샘) 비대로 인한 배뇨곤란을 가진 환자는 의사의 지시가 없는 한 복용하지 말 것.
3. 이상반응
  - 1) 교감신경아민을 포함한 약제는 다음과 같은 이상반응이 나타날 수 있다.  
: 공포, 불안, 긴장, 진전(떨림), 쇄약, 창백, 호흡곤란, 배뇨곤란, 불면, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 어지러움, 저혈압을 동반한 심혈관 허탈
  - 2) 페닐레프린에 과민인 사람은 빈맥(빠른 맥), 두통(두근거림), 두통, 어지러움, 오심(구역) 등의 에페드린양 반응이 나타날 수 있다. 그러나 페닐레프린을 적량 투여 시는 이런 이상반응이 나타나지 않는 안전한 약물이다.
  - 3) 항히스타민제에 과민인 사람은 중증도의 진정작용을 나타낼 수 있다.
  - 4) 항히스타민제로 인한 다른 부작용은 구갈(목마름), 어지러움, 쇄약, 식욕부진, 오심(구역), 구토, 두통, 신경과민, 다뇨증(소변량과다), 가슴앓이, 복시(겉보임), 배뇨곤란 등이 있고 드물게 피부염이 나타날 수도 있다.
  - 5) 졸음을 일으킬 수 있으며, 알코올, 진정제, 신경안정제 등이 졸음을 증가시킬 수 있다.
  - 6) 어린이에게는 특히 흥분이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
  - 1) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 의사와 상의할 것
  - 2) 이 약의 복용 중에는 알코올성 음료를 피할 것
  - 3) 이 약의 복용 중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 할 것
  - 4) 용량을 초과하지 않도록 하고, 사고로 과량 복용 시에는 의사와 상의할 것
  - 5) 이 약의 복용에 의해 어지러움, 불면, 신경과민 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사와 상의할 것
5. 소아에 대한 투여  
2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 2세 미만의 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
  - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
  - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
  - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관한다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃) 사용기간 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】 500ml (조제용)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 주의

1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831



대우제약(주)

서울특별시 서초구 남부순환로 2465 원미빌딩 (서초동)  
부산광역시 사하구 다대로 153(신평동)

최종개정년월일: 2008. 02. 29  
작성년월일: 2012. 12. 13

※ 이 첨부문서 작성일자(2012년 12월 13일)이후 변경된 내용은 <http://www.daewoopharm.com>나 051-204-3831(대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.