



타스펜 이알서방정650mg

일반의약품

의약품 분류번호	114 해열·진통, 소염제
-------------	----------------------

타스펜 이알 서방정은 비피리딘계이면서 카페인을 함유하지 않은 해열진통제로서 작용시간이 지속적이므로 두통과 치통, 근육통은 물론 감기로 인한 발열등에 대하여 우수한 효과를 나타내는 해열 진통제입니다.

【성분·함량】 1정 중 아세트아미노펜(KP).....650mg (속방과립 중 아세트아미노펜 325mg+서방과립 중 아세트아미노펜 325mg)

【성 상】 백색의 장방형 필름코팅정제

【작용 및 특징】

1. 타스펜 이알 서방정은 신속히 봉쇄되는 부분이 이상적으로 결합되어 있어 8시간 동안 해열 진통 효과를 발휘합니다.
2. 타스펜 이알 서방정은 아스피린 등의 약제에서 생기는 위장관계 부작용이 거의 나타나지 않으므로 안심하고 사용할 수 있습니다.
3. 타스펜 이알 서방정은 무카페인, 비피리딘계 해열진통제이므로 이들 약제 사용시 흔히 나타나는 알러지 반응과 중추신경계 흥분작용이 없습니다.
4. 타스펜 이알 서방정은 정상시의 체온에 대해서도 거의 영향을 미치지 않으며 과도로 증가된 체온을 떨어뜨려 줍니다.

【효능·효과】

해열 및 감기에 의한 동통(통증)과 두통, 치통, 근육통, 허리동통(통증), 생리통, 관절통의 완화

【용법·용량】

12세 이상의 소아 및 성인: 매 8시간마다 2정씩 복용합니다.
24시간 동안 6정을 초과하지 마십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 1) 이 약에 과민증 환자
 2) 소화성궤양 환자
 3) 심한 혈액이상 환자
 4) 심한 간장애 환자
 5) 심한 신장장애 환자
 6) 심한 심장기능저하 환자
 7) 아스피린 전신(비스테로이드성 소염(항염)제에 의한 전신발작 유발) 또는 그 병력이 있는 환자
 8) 다음의 약물을 복용한 환자: 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제
 9) 알코올을 복용한 사람
 10) 12세 미만의 소아
3. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것
 1) 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.
 2) 이 약은 서방형 제제이므로 정제를 으개거나 씹거나 녹이지 말고 그대로 삼켜서 복용해야 한다.
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 1) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자
 2) 신장장애 또는 그 병력이 있는 환자
 3) 소화성궤양의 병력이 있는 환자
 4) 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자
 5) 출혈경향이 있는 환자(혈소판기능 이상이 나타날 수 있다.)
 6) 심장기능 이상이 있는 환자
 7) 과민증의 병력이 있는 환자
 8) 기관지 천식 환자
 9) 고령자(노인)
 10) 임부/수유부
 11) 와파린을 장기복용하는 환자
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
 1) 속: 속, 아니필락시양 증상(과민성유사증상: 호흡곤란, 몸통이 붉어짐, 혈관부기, 두드러진 이여짐>>

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 사용기간: 제조일로부터 36개월

【포장단위】 500정(조제용), 30정(조제용), 12정

- * 이 제품은 이종정 정제로써 취급중 추락 또는 심한 흔들림, 충격으로 인하여 이종정의 두 층이 분리될 우려가 있소니 취급에 주의해 주시기 바랍니다.
- * 본 제품의 비조제용 날발모음포장은 어린이의 약물사고 방지를 위해 안전용기포장을 사용하였습니다. 복용시 강하게 눌러 개봉하십시오.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된(KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831



대우제약(주)

서울특별시 서초구 남부순원로 2455 원림빌딩 (서초동)
부산광역시 사하구 다대로 153(신평동)

최종개정년월일: 2015. 01. 31
작성년월일: 2015. 01. 02

* 이 첨부서 작성일자(2015년 1월 2일)이후 변경된 내용은 <http://www.daewoopharm.com>나 051-204-3831 (대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.

러기 등), 전신발작

- 2) 혈액: 혈소판 감소, 과립구감소, 용혈성빈혈, 메트헤모글로빈혈증, 혈소판기능 저하 (출혈시간 연장), 청색증
- 3) 과민증: 과민증상(얼굴부기, 호흡곤란, 땀이 남, 저혈압, 속)
- 4) 소화기: 구역, 구토, 식욕부진, 장기복용시 위장출혈, 소화성궤양, 천공(뚫림) 등의 위장관계 이상반응
- 5) 피부: 발진, 알레르기 반응, 피부점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성피피교사증(리얼 증후군)
- 6) 기타: 장기투여시 만성간괴사, 급성체장(이자)염, 만성간염, 신장독성
- 7) 과량투여: 간장, 신장(콩팥), 심근의 괴사
- 8) 이 약에 대해 시판 후 조사에서 보고된 추가적 이상반응은 아래 표와 같다. 발현빈도는 매우 흔히 $\geq 1/10$, 흔히 $\geq 1/100$ 및 $< 1/10$, 흔하지 않게 $\geq 1/1,000$ 및 $< 1/100$, 드물게 $\geq 1/10,000$ 및 $< 1/1,000$, 매우 드물게 $< 1/10,000$ 이다.

표. 자발적 보고율로부터 추정된 빈도에 따른 이 약의 시판후 경험에서 밝혀진 이상반응

면역계 장애

매우 드물게: 아니필락시스 반응, 과민증

피부 및 피하조직 장애

매우 드물게: 두드러기, 소양성(가려움) 발진, 발진

- 9) 국내 부작용 보고자료의 분석 · 평가에 따라 다음의 이상반응을 추가한다.

· 간담도계: AST 상승, ALT 상승

· 피부: 고정발진

6. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항

1) 일반적주의

- (1) 과민증상을 예측하기 위해 충분한 상담을 받아야 한다.
- (2) 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)이다.
- (3) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
가. 장기복용하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 받고 이상이 있을 경우 감량(줄임), 복용중지 등의 적절한 조치를 해야 한다.
나. 약물요법 이외의 치료법도 고려한다.
- (4) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
가. 급성통증 및 발열의 정도를 고려하여 복용한다.
나. 원칙적으로 동일한 약물의 장기복용은 피한다.
다. 원인요법이 있는 경우에는 실시한다.
- (5) 소아 및 고령자(노인)는 최소 필요량을 복용하고 이상반응에 유의한다. 과도한 체온강하, 허탈, 사지냉각 등이 나타날 수 있으므로 특히 고열을 수반하는 소아 및 고령자(노인) 또는 소모성 질환 환자의 경우, 복용 후의 상태를 충분히 살펴야 한다.
- (6) 다른 소염(항염)진통제와 함께 복용하는 것은 피한다.
- (7) 의사 또는 약사의 지시없이 통증에 10일 이상(성인) 복용하지 않고 발열에 3일 이상 복용하지 않는다. 통증이나 발열 증상이 지속되거나 악화될 경우, 또는 새로운 증상이 나타날 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
- (8) 이 약 복용시 감염증을 일으키지 않게 할 수 있으므로 감염증이 합병된 환자의 경우에 의사처방에 따라 적절한 항균제를 함께 복용해야 한다.

2) 과량투여시의 처리

이 약을 과량복용시 어떠한 명백한 증상이나 징후가 없더라도 신속하게 의학적 처치를 받아야 한다. 10~12시간 이내에 N-아세트아미노펜 정맥주사를 투여받거나 메치오닌을 경구복용하여 간을 보호해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품은 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.