

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사와 상담하시기 바랍니다.

분류번호: 239 (기타의 소화기관용약) **전문의약품**

맥페란[®] 정 MACPERAN tablets

메토클로프라미드

【원료약품의 분량】 1정 중

주성분:메토클로프라미드(Metoclopramide, KP) 384mg

【성 상】 흰색의 원형 필름 코팅정

【효능 · 효과】

성인

- 항암화학요법 후 지연된 구역 · 구토 예방
- 방사선요법 유발 구역 · 구토 예방
- 구역 · 구토의 증상 치료

- ~18세 소아
- 2차 치료로써 항암화학요법 후 지연된 구역 · 구토 예방

【용법 · 용량】

비록 구토 또는 옴량 거부가 있었더라도, 투여간격은 적어도 6시간 이상이 권장됩니다.

- 성인 : 염산메토클로프라미드로서 1일 10~30mg(메토클로프라미드로서 7.7~25.4mg)을 2~3회 분할하여 식전에 경구투여합니다. 일일최대권장 용량은 30mg 또는 체중 kg 당 0.5mg이며, 최대 권장 치료기간은 5일입니다.
- 소아 : 권장용량은 체중 kg 당 0.1~0.15mg이며, 일일 3회까지 반복하여 투여합니다. 24시간 내 최대용량은 체중 kg당 0.5mg입니다.

(용량표)

연령	체중	1회 투여량	투여빈도
1~3세	10~14kg	1mg	일일 3회까지
3~5세	15~19kg	2mg	일일 3회까지
5~9세	20~29kg	2.5mg	일일 3회까지
9~18세	30~60kg	5mg	일일 3회까지
15~18세	60kg 초과	10mg	일일 3회까지

항암화학요법 후 지연된 구역 · 구토 예방에 대한 최대치료기간은 5일입니다.

이 약은 1세 미만 소아에게 금기입니다.

- 노인 : 신장 및 간 기능, 전체적인 쇠약도에 근거하여 용량감소를 고려해야 합니다.

- 신장에 환자: 말기신장질환자(크레아티닌 청소율 ≤ 15ml/min)는 일일 용량을 75%까지 감소해야 합니다. 중증도에서 중증 신장에 환자(크레아티닌 청소율 15~60 ml/min)는 용량을 50%까지 감소해야 합니다.

- 간장에 환자 : 중증 간장에 환자는 용량을 50%까지 감소해야 합니다.

【사용상의 주의사항】

- 경고

지발성운동장애 : 메토클로프라미드의 장기 또는 고용량 사용은 해당 의약품 사용을 중단해도 지발성운동장애(tardive dyskinesia)의 발생 위험이 있습니다. 이는 복용기간, 복용횟수와 직접적 관련이 있으며 노인, 특히 여성 노인과 장기 사용 환자에게 위험하므로 메토클로프라미드 제제를 3개월 이상 장기 사용하지 않는 것이 바람직합니다.

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 크롬친화세포종(갈색세포종) 환자(급격한 승압발작을 일으킬 수 있습니다)
- 이 약에 대해 과민증 또는 불내성 환자
- 위장관 출혈, 기계적 장폐색, 천공 등 위장관 운동 자극이 위험한 환자
- 신경이완제 또는 메토클로프라미드 유발 지연성 이상운동증 병력 환자
- 간질(발작 빈도 및 강도 증가) 환자
- 파킨슨병 환자
- 레보도파 또는 도파민효능제 병용투여 환자
- 잘 알려진 메토클로프라미드에 의한 메트헤모글로빈혈증 또는 NADH 시토크롬 b5 결핍 병력 환자
- 1세 미만 소아 (추체의로장에 위험성 증가)
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1~18세 소아(추체의로증상이 발현하기 쉽기 때문에 과량투여하지 않도록 주의합니다. 특히 탈수상태, 발열시 등에는 주의합니다.)
- 고령자
- 신장에 환자
- 탈수 · 영양불량 등을 수반한 신체적 피폐 환자(말린중후군이 나타날 수 있습니다.)

- 이상반응

- 속, 아나필락시양 증상 : 드물게 속, 아나필락시양 증상(호흡곤란, 후두부종, 두드러기 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 말린중후군(악성신경마비 증후군) : 운동마비, 심한 근육강직, 연하곤란, 실어증, 빈맥, 혈압변화, 발한 등이 나타나고, 이러한 증상과 더불어 발열이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 체온각과 수분보급 등의 전신적 치료와 함께 적절한 처치를 하십시오. 이 증상의 발현시에는 백혈구 증가, 혈청 CPK지 상승이 자주 나타나고 미오글로빈노증을 수반한 신기능 저하가 나타날 수 있습니다. 또한 고열이 지속되고 의식장애, 호흡곤란, 순환허탈과 탈수증상, 급성신부전으로 발전해서 사망했다는 보고가 있습니다.
- 내분비계 : 드물게 간뇌의 내분비기능조절이상(성선자극호르몬 및 펄라틴 분비이상)에 유래한다고 추정되는 무월경, 지속성 유즙 누출 및 여성형 유방 등이 나타나는 경우가 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 투여를 중지하십시오.
- 추체의로 증상 : 드물게 수지진전, 근경직, 경 · 안부의 연축, 안구회전발작, 초조감 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오. 또한 이러한 증상이 심한 경우에는 항파킨슨제 투여 등의 적절한 처치를 하십시오. 장기 투여에 의해서 드물게 입주위 등의 불수의 운동이 나타나고 투여중지후에도 지속되는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 적절한 처치를 하십시오.
- 소화기계 : 때때로 위의 긴장증가, 복통, 설사, 변비 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 순환기계 : 드물게 혈압강하, 빈맥, 부정맥 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 정신신경계 : 때때로 두통, 두중, 졸음, 드물게 흥분, 불안감 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 경련 : 드물게 경련이 발생하는 수가 있습니다. 이때에는 투여를 중단하고 적절한 처치를 하십시오.
- 기타 : 때때로 권태감, 드물게 발진, 부종이 나타날 수 있습니다.
- 그 외 이상반응 : 이상반응은 기관계별로 나타내었으며, 빈도는 다음과 같이 정의합니다.:매우 흔하게 (≥1/10), 흔하게 (≥1/100, 1/100), 흔하지 않게 (≥1/1000, 1/100), 드물게 (≥1/10000, 1/1000), 매우 드물게 (1/10000), 알 수 없음(이용가능한 자료로부터 예측할 수 없음)

기관	빈도	이상반응
혈액 및 림프계 장애	알수없음	특히 신생아에서 NADH 시토크롬 b5 환원제와 관련될 수 있는 메트헤모글로빈혈증 주로 황을 방출하는 약물을 고용량으로 병용투여했을 때, 항혈색소혈증
심장 장애	흔하지 않게	특히 정맥투여했을 때, 서맥
	알수없음	주사제 투여 후 짧게 발생하며, 그 다음에 서맥이 발생할 수 있는 심장정지; 특히 정맥주사 투여시 방실차단, 동정지; 심전도 QT 연장; 다형성 심실 빈맥(Torsade de Pointes)
	흔하지 않게	무월경, 고프로락틴혈증
내분비계 장애*	드물게	젖분비과다
	알수없음	여성형유방증
위장관계 장애	흔하게	설사
일반적 장애 및 투여부위 상태	흔하게	무력증
면역계 장애	흔하지 않게	과민증
	알수없음	아나필락시스 반응(특히 정맥주사 투여시 아나필락시스 쇼크 포함)
신경계 장애	매우 흔하게	졸림
	흔하게	추체외로장애(특히 어린이, 젊은 성인 및/또는 권장용량 초과 투여, 비록 단회투여 이후일지라도), 파킨슨증, 좌불안석
	흔하지 않게	근긴장이상, 이상운동, 의식저하
	드물게	특히 간장에 환자에서 발작
정신계 장애	알수없음	특히 노인환자에서 치료 연장 후 또는 치료 중 영구적일 수 있는 지연성이상운동증, 신경이완 약성 증후군
	흔하게	우울증
	흔하지 않게	환각
혈관계 장애	드물게	혼란상태
	흔하게	특히 정맥주사 투여시 저혈압
	알수없음	크롬친화세포종 환자에서 급성 고혈압, 주사제 투여 후 쇼크, 실신

뒷면계속 →

*치료연장 중 내분비계 장애는 고프로락틴혈증과 관련된(무월경, 젖분비과다, 여성형유방증)

다음과 같은 이상반응은 고용량 투여시 때때로 관련이 있으며 더 빈번하게 나타납니다.:

-추체의로증상: 특히 어린이 및 젊은 성인에서, 비록 단회 투여 후라고 하더라도, 급성 근긴장이상, 이상운동, 파킨슨증후군, 좌불안석

-졸음, 의식저하, 혼동, 환각

1) 국내 유해사례 보고자료(1989~2010년)를 검토 분석한 결과 다른 의약품에서 발생한 유해사례보다 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해 사례는 다음과 같습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

- 소화기계 :오심, 구토
- 추체의로 증상 :저린증상 등 감각이상
- 기타 :가슴통증

- 일반적 주의

1) 드물게 간뇌의 내분비기능조절이상, 추체의로증상 등의 부작용이 나타날 수 있으므로 투여할 경우에는 유효성과 안전성을 충분히 고려한 후에 투여합니다.

2) 신경학적 장애 : 특히 어린이와 젊은 성인 및/또는 고용량 사용시 추체의로장애가 발생할 수 있습니다. 이러한 반응들은 일반적으로 치료 시작시 발생하고 단회 투여시에도 발생할 수 있습니다. 추체의로 증상이 나타났을 때 메토클로프라미드를 즉시 중단해야 합니다. 이러한 효과는 일반적으로 치료 중단 후 완전하게 가역적이나, 증상 치료가 필요할 수 있습니다. (소아의 경우 벤조디아제핀 및/또는 성인의 경우 항콜린성 항파킨슨병제제) 용법용량에서 언급하였듯이 비록 구토 및 용량투여를 거부했더라도 과량투여를 피하기 위하여 각각의 메토클로프라미드 투여간 시간간격은 적어도 6시간이어야 합니다.

메토클로프라미드 치료를 연장하였을 때 특히 노인에서 잠재적으로 비가역적인 지연성이상운동증이 발생할 수 있습니다. 지연성이상운동증 위험성 때문에 치료는 3개월을 초과해서는 안됩니다. 지연성이상운동증에 대한 임상적 징후가 나타날 경우 치료를 중단해야 합니다.

신경이완약성증후군은 메토클로프라미드와 신경이완제 병용투여 뿐만 아니라 메토클로프라미드 단독투여에서도 보고되었습니다. (이상반응 항 참고) 신경이완 약성증후군 증상이 나타났을 때 메토클로프라미드는 즉시 중단해야 하며 적절한 치료를 시작해야 합니다.

기존 신경학적 상태가 있는 환자 및 다른 중추작용약으로 치료받고 있는 환자들은 특수치료를 받아야 합니다.

메토클로프라미드는 파킨슨병 증상 또한 악화시킬 수 있습니다.

3) 메트헤모글로빈혈증 : 메트헤모글로빈혈증은 NADH 시토크롬 b5 환원효소 결핍과 관련성이 있을 수 있음이 보고되었습니다. 이런 경우, 메토클로프라미드는 즉시 영구적으로 중단해야 하며(메칠렌블루 치료와 같은) 적절한 치료가 시작되어야 합니다.

4) 심장질환 : 메토클로프라미드를 특히 정맥투여경로로 투여 후에 순환허탈, 심각한 서맥, 심장정지, OT 연장을 포함한 원하지 않는 심각한 심혈관계 효과들이 보고되었습니다.

노인환자, 심장전도장애환자(QT연장 포함), 조절되지 않는 전해질불균형환자, 서맥환자, QT간격을 연장시키는 것으로 알려진 다른 약물들을 복용한 환자들에게 메토클로프라미드를 특히 정맥투여경로로 투여할 때는 특수치료를 실시해야 합니다.

5) 신장 및 간장애 : 신장에 환자 또는 심각한 간장애 환자는 용량 감소를 권장해야 합니다.

6) 이 약은 음식물의 흡수 및 분포에 영향을 미칠 수 있으므로 인슐린 용량이나 투여시간을 조정할 필요가 있습니다.

7) 메토클로프라미드는 시력에 영향을 미칠 수 있는 졸음, 어지럼, 이상운동, 근긴장이상을 일으킬 수 있으며 운전 및 기계조작능력을 방해할 수 있습니다. 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계의 조작을 하지 않도록 주의합니다.

- 상호작용

1) 다음 약물과의 병용에 의해 내분비기능 조절이상 또는 추체의로 증상이 나타날 수 있으므로 이들과 병용할 경우에는 충분히 관찰하고 신중히 투여하십시오. : 다른 벤즈아미드계 약물(설피리드, 티아프리드 등), 페노치아진계 약물(프로클로르페라진, 클로르프로마진, 디에칠페라진 등), 부티로페논계 약물(할로페리돌 등), 라우올피아알칼로이드 약물(데세르핀 등)

2) 디기탈리스제제 포화시의 지표인 구역, 구토, 식욕부진 등의 증상을 은폐할 수 있으므로 디기탈리스제제를 투여중인 환자에는 충분히 관찰하고 신중히 투여합니다. 메토클로프라미드는 디곡신의 생체이용률을 감소시킬 수 있습니다. 디곡신의 혈장농도를 주의깊게 모니터링하는 것이 필요합니다.

3) 카르바마제핀의 혈중농도를 급속히 상승시킬 수 있으므로 병용하는 경우에는 충분히 관찰하고 신중히 투여하십시오.

4) 위장관 운동에 대한 이 약의 효과는 항콜린제 및 마약성 진통제에 의해 길항됩니다. 이 약을 알코올, 중추신경계저하제 (모르핀 유도제, 항불안제, 진정작용 대항히스타민제, 진정작용 항우울제, 바르비탈계 약물, 클로니딘 및 관련 약물)와 병용시 진정효과가 증가됩니다.

5) 신경이완제 : 메토클로프라미드는 추체의로장에 발생물에 있어 다른 신경이완제와 부가효과를 나타낼 수 있습니다.

6) 세로토닌성약물 : 선택적 세로토닌 재흡수 억제제 (SSRIs)와 같은 세로토닌성약물과 메토클로프라미드를 병용투여했을 때 세로토닌증후군 위험성을 증가시킬 수 있습니다.

7) 사이클로스포린 : 메토클로프라미드는 사이클로스포린의 생체이용률을 증가시킬 수 있습니다. (최고혈중농도 46%까지 증가, 노출은 22%까지 증가) 사이클로스포린의 혈장농도를 주의깊게 모니터링하는 것이 필요합니다.

8) 미바쿠리움 및 석사메토니움 : 메토클로프라미드 주사는 신경근육차단기간을 연장할 수 있습니다. (혈장 콜린에스테라제 저해) 9) 강력한 CYP2D6 저해제 : 플루옥세틴 및 파록세틴과 같은 강력한 CYP2D6 저해제와 병용투여했을 때 메토클로프라미드 노출 농도가 증가합니다. 비록 임상적 유의성은 명확하지 않지만 이상반응에 대하여 환자들을 모니터링해야 합니다.

- 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부

임부에 대한 대규모자료(1,000명 이상 노출결과)에서 최기형성 또는 발생독성이 나타나지 않았습니다. 임상적으로 필요하다면 임신 중에 메토클로프라미드를 사용할 수 있습니다. 다른 신경이완제와 같이 약리학적 특성 때문에 임신 말기에 메토클로프라미드를 투여하는 경우 신생아 추체의로중후군을 배제할 수 없습니다. 메토클로프라미드는 임신 말기에 피해야 하며, 만약 투여해야 한다면 신생아에 대한 모니터링을 수행해야 합니다.

2) 수유부

메토클로프라미드는 낮은 농도로 모유로 분비됩니다. 모유로 수유하는 아기들에게 이상반응을 배제할 수 없으므로, 메토클로프라미드는 수유 중에 권장되지 않습니다. 수유부에게 메토클로프라미드 중단을 고려해야 합니다.

- 고령자에 대한 투여 : 대부분 신장으로 배설되기 때문에, 신기능이 저하되기 쉬운 고령자의 경우 높은 혈중농도가 지속될 수 있으므로 부작용(추체의로증상)의 발현에 주의하고 용량 및 투여간격에 유의하는 등 신중히 투여하십시오,

- 과량투여시의 처치

1) 증상

이 약의 대량투여로 메트헤모글로빈혈증이 나타났다는 보고가 있습니다. 추체의로장애, 졸음, 의식저하, 혼동, 환각, 심폐정지가 발생할 수 있습니다.

2) 관리

과량투여와 관련되거나 관련되지 않은 추체의로증상이 나타났을 때, 오직 증상치료만 할 수 있습니다. (소아의 경우 벤조디아제핀계 약물 및/또는 성인의 경우 항콜린성 항파킨슨병지료제)

임상적인 상태에 따라 증상치료와 심혈관계 및 폐기능에 대한 지속적인 모니터링을 수행해야 합니다.

- 기타

1) 약물동태학적 특성

(1) 신장에

메토클로프라미드는 중증의 신장에 환자에서 혈장소실반감기가 증가하는 한편(크레아티닌 청소율이 10~50 ml/분일 때 약 10시간 및 크레아티닌 청소율이 10ml/분 미만일 때 약 15시간), 청소율은 70%까지 감소합니다.

(2) 간장에

간경화증이 있는 환자들에서 메토클로프라미드가 축적되는 것이 보고되어 왔으며, 혈장청소율이 50% 감소하는 것과 관련이 있습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온 (1~30℃) 보관

【포장단위】 맥페란 정 100정, 1000정

【문의전화】 본사 : (02)2021-9300, 소비자상담실 : 080-023-1897(수신자료금부담)

【제조자】 동화약품(주), 본사 : 서울특별시 중구 후암로 98, 19층, 공장 : 충청북도 충주시 충주산단 1로 167

본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 온라인약도서관 (http://drug.mfds.go.kr)을 참조해주시기 바랍니다.
1405

본 의약품은 KCMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※이 첨부문서 작성일자(2014년 5월 28일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.

