

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

분류번호: 618(주요 그림양성, 음성균에 작용하는 것) **전문의약품**

항생제

파목신®
캡슐 250mg/500mg
아목시실린수화물

PAMOXIN capsules 250mg/ 500mg

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

파목신캡슐 250mg

주성분: 아목시실린 수화물(Amoxicillin Hydrate, KP) 250mg(역가)

첨가제(타르색소): 적색40호, 황색5호, 청색1호, 황색203호

파목신캡슐 500mg

주성분: 아목시실린 수화물(Amoxicillin Hydrate, KP) 500mg(역가)

첨가제(타르색소): 적색3호, 황색203호, 청색1호, 황색5호

【성상】 파목신캡슐 250mg - 내용물이 백색 ~ 미황색의 가루 또는 과립인 상·갈색, 하·담황색의 캡슐체
파목신캡슐 500mg - 내용물이 백색 ~ 미황색의 가루 또는 과립인 상·심청색, 하·담황색의 캡슐체

【효능·효과】

1. 유효균종: 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 포도구균, 임균, 인플루엔자균, 대장균, 프로테우스(특히 프로테우스 미라빌리스)

2. 적응증

- 중기, 용종, 연조직염, 농가진, 농피증, 창상 및 수술후 2차 감염, 단독
- 편도염, 인후두염, 중이염, 림프절염, 부비동염, 발치 후 감염
- 폐렴, 기관지염, 폐농양, 농흉
- 성홍열, 세균성심내막염
- 신우신염, 방광염, 요도염, 임균성요도염
- 복막염, 간농양, 장티푸스
- 골수염
- 자궁내감염

【용법·용량】

- 성인 및 체중 20kg 이상인 소아: 아목시실린수화물로서 1회 250~500mg(역가) 1일 3회 경구 투여하십시오.
 - 체중 20kg 미만인 소아: 1일 체중 kg당 20~40mg(역가)을 3회 분할 경구 투여하십시오.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 속의 병력이 있는 환자
- 2) 이 약 또는 페니실린계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 3) 전염단핵구증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 세균계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 본인 또는 부모, 형제가 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기증상을 일으키기 쉬운 체질인 환자
- 3) 중증의 신장에 환자(혈중 농도가 계속 유지되므로 투여간격을 연장하십시오.)
- 4) 경구 섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하십시오.)
- 5) 이약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 이상반응

- 1) 속: 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 불쾌감, 구내이상감, 천명, 어지러움, 변의, 이명 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 2) 과민반응: 발열, 발진, 두드러기, 혈청병양 반응, 다형성 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오. 간질성 신염도 나타날 수 있습니다.
- 3) 소화기계: 구역, 구토 드물게 위막성대장염 등의 혈변을 수반하는 중증의 대장염이 나타날 수 있습니다. 복통, 빈번한 설사가 나타날 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
- 4) 혈액계: 드물게 호산구 증가, 무과립구증, 적혈구 감소, 혈소판 감소, 빈혈, 혈소판 감소성 자반증, 백혈구 감소, 프로트롬빈시간 연장 등이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 5) 중추신경계: 드물게 가역성 활동항진, 초조, 불안, 불면, 착란, 행동변화가 보고되어 있습니다. 항부(목부위)경직, 발열, 두통, 오심·구토 또는 의식 혼탁 등을 수반되는 무균성수막염이 나타날 수 있으니 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

- 6) 피부 : 드물게 박탈피부염, 스티븐스-존슨증후군과 독성표피괴사증후군이 나타날 수 있습니다. 또한 급성범 발성발진성농포증이 빈도불명으로 나타날 수 있으므로 이러한 증상을 충분히 관찰하고, 발열, 두통, 관절염, 피부와 점막의 홍반·수포, 농포, 피부의 긴장감·작열감·통증 등의 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
 - 7) 간장 : 드물게 황달, AST, ALT의 상승 등이 나타날 수 있습니다.
 - 8) 신장 : 드물게 급성 신부전 등의 중증의 신장장애가 나타날 수 있으므로, 정기적으로 검사를 하는 등 충분히 관찰하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
 - 9) 균교대증 : 드물게 균교대에 의하여 구내염, 대장염이 칸디다증 또는 비감수성 클레브시엘라등에 의해 나타날 수 있습니다. 이러한 현상이 나타날 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
 - 10) 비타민 결핍증 : 드물게 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있습니다.
 - 11) 기타 : 야리시해독스하이머 반응(매독증상의 증중화)이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직합니다.
 - 2) 속 등의 반응을 예측하기 위해 충분히 문진하고 사전에 피부반응시험을 실시하는 것이 바람직합니다.
 - 3) 속 발생에 대비하여 구급처치준비(에피네프린, 산소공급, 스테로이드제의 정맥투여, 기도처치(삽관법 등))를 해 두고 투여 후에도 환자를 안정한 상태에서 충분히 관찰하십시오.
 - 4) 이 약 치료 중에는 진균 및 세균(장내세균, 녹농균, 칸디다균 등)에 의한 2차 감염이 발생하지 않도록 주의해야 하며, 2차감염 시에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
 - 5) 고용량 투여 시 아목시실린 결정뇨를 방지하기 위해서 적절한 수분섭취와 요량을 유지해야 합니다.
5. 상호작용
- 1) 알로푸리놀과 병용투여 시 피부의 이상반응을 증가시킬 수 있으므로 병용투여하지 않습니다.
 - 2) 프로베네시드와 병용투여 시 이 약의 세뇨관 배설 속도가 감소되어 혈중농도를 지속시킬 수 있습니다.
 - 3) 경구 피임약과 병용투여 시 피임의 효과가 감소될 수 있으므로 다른 피임법을 추가로 사용하는 것이 바람직합니다.
 - 4) 정균성 항생물질(클로람페니콜, 에리스로마이신, 테트라사이클린 등)과 병용투여 시 이 약의 살균작용을 감소시킬 수 있습니다.
 - 5) 인도메타신, 살리실레이트의 소염제와 병용투여 시 이 약의 효과를 증가시킬 수 있습니다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 임신 중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
 - 2) 모유 중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우 주의하십시오.
7. 소아에 대한 투여
- 저체중출생아, 신생아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.
8. 고령자에 대한 투여
- 고령자인 경우에는 다음과 같은 점에 주의하여 용량 및 투여간격에 주의하는 등 환자의 상태를 관찰하고 신중히 투여하십시오.
- 1) 일반적으로 생리기능이 저하되어 있어 이상반응이 발현하기 쉽습니다.
 - 2) 비타민K 결핍으로 출혈경향이 나타날 수 있습니다.
9. 임상검사치에의 영향
- 1) 테스테이프 반응을 제외한 베네딕트시약, 펠링시약, 클리니테스트에 의한 요당검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의하십시오.
 - 2) 임부에 투여 시, 총 결합 에스트리올, 에스트리올-글루쿠로니드, 결합 에스트론, 에스트라디올의 일시적인 혈중농도 감소가 있을 수 있습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 파목신캡슐 250mg 30캡슐

파목신캡슐 500mg 30캡슐

【문의전화】 본사 : (02)2021-9300

소비자 상담실 : 080-023-1897(수신자 요금부담)

【제조회사】 동화약품(주), 본사 : 서울특별시 중구 후암로 98, 19층, 공장 : 충청북도 충주시 충주산단1로 167

【제조사】 보령제약(주), 경기도 안산시 단원구 능안로 107, 109

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

1506

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 6월 10일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.



동화약품

SINCE 1897