

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.



분류번호 : 611(주로 그람양성균에 작용하는 것) **일반의약품**

FUCIDIN[®] ointment

【원료약품의 분량】 1g 중

주성분 : 퓨시드산나트륨(Sodium Fusidate, KP) 20mg(역가)

【성 상】

이 약은 무색의 반투명한 연고제입니다.

【효능·효과】

1. 유효균종

포도구균(포도알균), 연쇄구균, 코리네박테륨, 클로스트리듐

2. 적응증

- 농피증(고름피부증)(농가진(고름딱지증), 감염성습진양피부염, 심상성여드름(보통여드름), 모낭염, 종기 및 종기증, 화농(끓음)성한선염, 농가진(고름딱지증)성습진), 화상·외상(상처)·봉합(꿰뚫)창·식피창(피부이식 후 생긴 상처)에 의한 2차 감염

【용법·용량】

환부(질환 부위)를 깨끗이 하고 1일 1~2회 적당량을 환부(질환 부위)에 직접 바르거나 무균거즈에 넓게 펴 발라 붙입니다. 두껍게 바르지 않고 보통 1주 정도로 투여기간을 제한합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.

- 1) 퓨시드산 및 그의 염에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 비감수성균(특히 녹농(푸른고름)균)에 의한 감염환자

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현(드러냄) 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직합니다.
- 2) 감각(과민상태로 만들)될 수 있으므로 충분히 관찰하고 감각(과민상태로 만들)된 증후(가려움, 발적(충혈되어 붉어짐), 종창(부기), 구진, 소수포(물집) 등)가 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 3) 이 약은 높은 투과흡수성을 가지므로 장기간 또는 광범위한 표면에 투여하지 않도록 주의하십시오.
- 4) 국소사용 시 내성균이 발현(드러냄)되면 추후 동일한 항생물질을 경구투여(복용) 시 해로울 수 있습니다. 그러나 대체로 내성균은 단시간내 다시 이 약에 대해 감수성을 갖게 됩니다.
- 5) 반복 투여 및 장기 연용(계속 사용)으로 인해 비감수성균이 과잉증식할 수 있습니다. 만일 균교대증이 발생하면 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 6) 안과용으로 사용하지 마십시오.
- 7) 눈 또는 눈꺼풀과 같은 얼굴 안쪽에 사용하는 것은 적합하지 않습니다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게 투여시 이 약은 전신투여 시 태반관문을 통과한다는 보고가 있으므로 국소사용 시 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 수유부가 유방감염에 이 약을 사용할 경우 신생아에게 흡수될 수 있습니다.

3) 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않고 전신투여 시 유즙으로의 이행이 보고되었으나 국소사용시 사용(일상적으로 사용)량에서는 영아(젖먹이)에 영향을 미치지 않습니다.

4) 미숙아 및 신생아는 간기능이 미숙하므로 장기간 또는 광범위한 표면에 투여할 경우에는 간기능 장애가 나타날 수 있으므로 주의하십시오.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.

일시적인 작열감(화끈감) 때때로 발진, 약한 동통(통증) 및 자극 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오. 또한 중증(심한 증상)의 다리궤양 환자에 적용시 통증이 유발될 수 있습니다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 후시딘 연고 5g, 10g

【문의전화】 본사 : (02)2021-9300, 소비자 상담실 : 080-023-1897(수신자 요금 부담)

【제조사】 동화약품(주)

본사 : 서울특별시 중구 후암로 98, 19층, 공장 : 충청북도 충주시 충주산단1로 167

본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

1510

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 10월 14일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.

