

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

분류번호 : 315(비타민 E 및 K제) **일반의약품**

말초혈액순환개선제

**씨이맥스<sup>®</sup>** 연질캡슐

**CE-MAX<sup>®</sup>** soft capsules

혈관은 신체 각 조직에 산소 및 영양분을 실어 보내주는 한편, 노폐물을 실어내는 중대한 역할을 담당하는 ‘생명 의 파이프’ 라고 할 수 있습니다.

노화나 공해·매연·담배연기 등의 유해물질에 의해 생성된 지질과산화물은 혈관 세포를 손상시키며, 혈액순환을 방해하는 응고된 혈액덩어리인 혈전의 생성을 촉진합니다. 이렇게 혈관이 손상되고 혈관벽에 지질과산화물·혈전·콜레스테롤 등이 침착되어 혈관이 제 기능을 다하지 못하게 되면 피로, 무력감을 느끼게 될 뿐만 아니라, 혈액순환장애에 의한 어깨·목결림·손발저림 또는 손발시림 등에 시달리게 되며, 나아가 동맥경화, 고혈압 등의 각종 성인병에 이르게 되어 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

씨이맥스는 고단위 천연 토코페롤과 비타민 C가 효과적인 상호협력작용을 나타내며, 혈관벽을 강화시키고 혈중 콜레스테롤 농도를 저하시킴으로써 혈액순환을 좋게 하여 각종 성인병의 예방과 말초혈액순환장애의 개선에 좋은 효과를 나타냅니다.

**【원료약품의 분량】** 1캡슐 중

주성분:아스코르브산(비타민 C, KP) ..... 500.0mg

주성분:비타민 E(USP) ..... 400.0 IU

(d- $\alpha$ -토코페롤로서 268.46mg)

첨가제(부형제):달맞이꽃 종자유(EF) ..... 200.0mg

**【성상】**

담황색의 점조(끈끈하고 뻑뻑함)한 액을 넣은 주황색 및 적갈색을 띤 장방형의 연질캡슐제입니다.

**【약리작용】**

1. 씨이맥스는 혈관벽에 축적되어 세포에 손상을 주고 혈행을 방해하는 지질과산화물과 콜레스테롤의 생성과 침착을 억제하여 혈관을 보호함<sup>1)</sup>과 동시에 혈관을 튼튼하게 해주어 동맥경화·고혈압과 같은 각종 성인병을 예방해 줍니다.
2. 씨이맥스는 말초혈관을 확장시켜주고 혈액순환을 촉진시켜, 어깨·목결림, 손발저림 또는 손발시림과 같은 말초혈액순환장애를 개선시켜주며, 다리동맥의 혈행장애로 인해 걸으면 다리가 저리고 아픈 간헐성 파행증(이따금 찢뚫거림)을 효과적으로 개선시킵니다.<sup>2)</sup>
3. 씨이맥스는 세포막 손상과 노화의 주범인 유리라디칼의 생성을 방지함으로써<sup>3)</sup>, 인체 조직의 노화를 지연시켜주며, 기미, 주근깨, 노인성 색소(지방갈색소)와 같은 피부색소의 이상침착을 예방·개선시켜줍니다.
4. 씨이맥스는 호르몬의 균형을 조절해 주어 안면홍조, 식은땀, 불면, 무기력, 피로 등의 다양한 증상으로 나타나는 갱년기장해를 개선합니다.
5. 씨이맥스는 인체의 면역력을 길러주어 감기나 기타 질병의 예방에 효과적이며, 최근에는 토코페롤과 비타민 C의 항암효과<sup>4)</sup>가 알려지고 있어 기대를 모으고 있습니다.
6. 씨이맥스는 활성이 높은 천연토코페롤과 비타민 C가 효과적인 상호협력작용<sup>5)</sup>을 나타냅니다.

**【효능·효과】**

· 다음 경우의 비타민 C, E의 보급

-육체피로

-임신·수유기

-병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시

-노년기

-이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

· 비타민 C(아스코르브산)

-햇빛, 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방

· 비타민 E(d- $\alpha$ -토코페롤)

-말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화:어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

**【용법·용량】**

성인 및 13세이상:1회 1캡슐, 1일 2회 복용하십시오.

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

2) 만 3개월 미만의 젖먹이

3) 콩기름에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

4) 콩 또는 땅콩에 과민반응이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria:요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

4) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

5) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

·구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.

3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.

5) 우발적으로 과량복용 한 경우

6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

3) 이 약은 달맞이꽃종자유를 함유하고 있으므로 발진 등의 알레르기 반응과 복통이 나타날 수 있습니다.

4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

**【저장방법】** 기밀용기, 차광실온(1~30℃)보관

**【포장단위】** 씨이맥스 연질캡슐 .....100캡슐

**【문의전화】** 본사:(02)2021-9300, 소비자상담실:080-023-1897(수신자 요금부담)

**【제조외지사】** 동화약품(주), 본사: 서울특별시 중구 서소문로9길 14, 공장: 충청북도 충주시 충주산단 1로 167

**【제 조 재】** (주)알피코프, 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7

Ref) 1) Internat. J. Vit. Nutr. Res. 59, 273~279, 1989

2) J. for Vascular Ds. 2, 280~287, 1973

3) DN&P 3(4), 202~208, May 1990

4) Internat. J. Epidem. Vol. 17, No. 2, 281~286, 1988

5) Arch. Biochem. Biophys., 279, 402~405, 1990

본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2014년 1월 28일) 이후 변경된 내용은 [www.dong-wha.co.kr](http://www.dong-wha.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.



**동화약품**

SINCE 1897