

아크라톤 정

25 mg
50 mg

(아크라토늄나파디실산염)

이 약은 Puerariae Radix로부터 추출한 소화기의 평활근수축작용을 갖는 Kassin R을 기초로 하여 일본 도야미화학에서 처음으로 개발한 이래, 이어서 폐사에서 국내최초로 개발한 소화기운동 기능이상 치료제입니다. 아크라톤은 경구투여 후 빠르게 흡수되어 각 조직의 Acetylcholine 수용체에 직접 작용하여 소화관운동을 촉진합니다. 특히 이 소화관운동 촉진작용은 위, 담관, Oddi 근에 현저하며 생체의 생리작용과 잘 일치하고 위액분비에는 거의 영향을 주지 않는 것이 특징입니다.

【원료약품 및 분량 : 1정 중】

- 아크라톤정25mg
아크라토늄나파디실산염(KP)..... 25 mg
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(건강한 소의 우유)
- 아크라톤정50mg
아크라토늄나파디실산염(KP)..... 50 mg
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(건강한 소의 우유)

· 아크라톤정25mg :

	앞	뒤
날임 식별		

· 아크라톤정50mg :

	앞	뒤
날임 식별		

【성상】

- 아크라톤정25mg
흰색의 원형 당막정
- 아크라톤정50mg
흰색의 원형 당막정

【효능·효과】

다음 경우에서의 소화기 기능이상(구역, 구토, 식욕부진, 복부팽만감) : 만성위염, 담도이상운동증, 소화관 수술후

【용법·용량】

성인 : 아크라토늄나파디실산염으로서 1회 25~50mg 1일 3회 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 기관지천식 환자
 - 감상선기능항진증 환자
 - 소화성궤양(활동기) 환자
 - 간질 환자
 - 파킨슨병 환자
 - 서맥 등 현저한 미주신경 항진 상태에 있는 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 부작용
 - 과민증 : 드물게 발진, 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여 중지한다.
 - 소화기계 : 때때로 복통, 설사, 구역, 구토, 두통, 위부불쾌감, 가슴쓰림, 변비, 식욕부진, 복명, 묽은 변, 타액증가 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지하는 것이 바람직하다.
 - 정신신경계 : 드물게 졸음, 수지진전이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지하는 것이 바람직하다.
 - 기타 : 드물게 삼개항진, 권태감, 발한이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지하는 것이 바람직하다.
- 일반적 주의
 - 부교감신경지극작용이 있으므로 주의하여 사용한다.
- 상호작용
 - 왕글린에스테라제와 병용투여하는 경우에 이 약의 작용이 증강될 수 있으므로 주의한다.
- 임부에 대한 투여
 - 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는다.
- 소아에 대한 투여
 - 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.
- 고령자에 대한 투여
 - 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 용량에 특히 주의한다.

【저장방법】

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보존

【포장단위】

자사포장단위(아크라톤정25mg : 300정 / 아크라톤정50mg : 300정, 1000정)

【사용(유효)기간】

제조일로부터 30개월

- ※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 온라인의약품사관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.
- ※ 본 의약품은 우수약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었다거나 변색, 변태, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ◆ 소비자상담실 : 080-388-3333 (수신자부담)
- ※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr) 또는 전화 (031)550-0472-8 (주)일화 학술·개발부를 통해 확인하실 수 있음

개정연월일 : 2015년 3월 4일



ILHWA Ph. • 제조자 : (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 가두단지길 55 • <http://www.ilhwa.co.kr>