조제용

500정

알게이트정

(알마게이트)

ILHWA Ph.

- 제조의뢰자 : (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 가두단지2길 55
- https://www.ilhwa.co.kr
- 제조자: 한국코러스(주)/ 충청북도 제천시 강저로 30

일반의약품 [현로약품 및 분량 : 1정 중]

- 유효성분 : 알마게이트(건)·····500.0mg
- 동물유래성분 : 유당수화물(건)(한 소의 우유)
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소

	앞	뒤
식별 표시	IH AL	

[성 상] 백색의 장방형 정제

[효능·효과]

다음 질환의 재선적용 및 증상의 개선 : 위십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 산트림

[용법·용량]

성인 및 12세 이상의 소아 : 알마게이트로서 1회 1 g을 1일 3회, 식후 30분 ~ 1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자
 2) 말초혀이며병 환자
 3) 저칼 환자
 4) 재택 저류부기 환자
 5) 임신 중독증 환자
 6) 설사 환자
 7) 전전되지 않은 소화 기관 출혈 환자
 8) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 테트라사이클린계 항생물질[환에 복용시 흡수를 억제할 수 있음]
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.
 (1) 비스테로이드성진통제(NSAID), 제산 지로제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철이온염 제제 : 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2 ~ 3 시간 간격을 두고 복용한다.
 (2) 실리실산염 : 산증의 배설을 증가시킨다.
 2) 신전애 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장애 환자에게는 권고되지 않는다.
 3) 신체 허약자, 안 흰점이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 안산염농량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음.
 4) 고령자
 5) 혈액구토 또는 혹색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자
 6) 심부 또는 만성폐고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
 1) 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사
 2) 주증도 복용하여도 중상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
6. 저장상의 주의사항
 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 2) 이 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오용에 따른 사고 발생이나 약품품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

[제조방법] 밀폐용기, 실온보관

[포장단위] 500정병, 1000정병

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36 개월

※ 자세한 공유하기 또는 신고사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr) 의약품등 정보 참조
※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ☎ 소비자상담실 : 080-2699-3333 (수신자부담)
※ 의약품의 정상적인 사용임에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.
※ 본 의약품을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 함상 본 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

개정연월일 : 2023년 04월 07일

0093 LF 230408



HDPE
뚜껑 : LDPE
재활용 어려움

제조번호 :

사용기한 :



(01)08806409006320

조제용

1000정

알게이트정

(알마게이트)

ILHWA Ph.

- 제조의뢰자 : (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 가두단지2길 55
- https://www.ilhwa.co.kr
- 제조자: 한국코러스(주)/ 충청북도 제천시 강저로 30

일반의약품 [현로약품 및 분량 : 1정 중]

- 유효성분 : 알마게이트(건)·····500.0mg
- 동물유래성분 : 유당수화물(건)(한 소의 우유)
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소

	앞	뒤
식별 표시	IH AL	

[성 상] 백색의 장방형 정제

[효능·효과]

다음 질환의 재선적용 및 증상의 개선 : 위십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 산트림

[용법·용량]

성인 및 12세 이상의 소아 : 알마게이트로서 1회 1 g을 1일 3회, 식후 30분 ~ 1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자
 2) 말초혀이며병 환자
 3) 저칼 환자
 4) 재택 저류부기 환자
 5) 임신 중독증 환자
 6) 설사 환자
 7) 전전되지 않은 소화 기관 출혈 환자
 8) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 테트라사이클린계 항생물질[환에 복용시 흡수를 억제할 수 있음]
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.
 (1) 비스테로이드성진통제(NSAID), 제산 지로제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철이온염 제제 : 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2 ~ 3 시간 간격을 두고 복용한다.
 (2) 실리실산염 : 산증의 배설을 증가시킨다.
 2) 신전애 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장애 환자에게는 권고되지 않는다.
 3) 신체 허약자, 안 흰점이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 안산염농량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음.
 4) 고령자
 5) 혈액구토 또는 혹색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자
 6) 심부 또는 만성폐고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
 1) 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사
 2) 주증도 복용하여도 중상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
6. 저장상의 주의사항
 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 2) 이 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오용에 따른 사고 발생이나 약품품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

[제조방법] 밀폐용기, 실온보관

[포장단위] 500정병, 1000정병

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36 개월

※ 자세한 공유하기 또는 신고사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr) 의약품등 정보 참조
※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ☎ 소비자상담실 : 080-2699-3333 (수신자부담)
※ 의약품의 정상적인 사용임에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.
※ 본 의약품을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 함상 본 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

제정연월일 : 2023년 04월 07일

0093 LZ 230400



HDPE
뚜껑 : LDPE
재활용 어려움

제조번호 :

사용기한 :



(01)08806409006337