

분류번호: 642

일반의약품

KGMP

적격업체

1회 요법 구충제

알비 정 400mg(알벤다졸)

【성분·함량】 1정 중

알벤다졸(USP) 400mg

첨가제(식약청인정 타르색소) : 적색3호, 황색5호 알루미늄레이크

【성상】 연한 오렌지색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충, 분선충의
감염 및 이들 혼합감염의 치료

【용법·용량】

성인 및 2세 이상의 유·소아

1) 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충 : 1정(400mg)을 1회 복용한다. 2세 이상 유·소아의 요충증은 1/2(200mg)을 1회 복용하고 7일 후 1/2(200mg)을 반복 복용할 수 있다.

2) 분선충 : 1일 1회 1정(400mg)을 3일간 복용한다.

3) 편충의 중증(심한 증상) 혼합 감염시 : 1일 1회 1정(400mg)을 3일간 복용한다.

※ 씹거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사를 중단하거나 하제(설사약)를 쓰는 등의 특별한 과정은 필요 없다.

※ 치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 경우에 따라 2차 복용을 실시할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고 : 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약 구성 성분에 과민반응 환자

2) 임부

3) 2세 미만의 영아(갓난아기)

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

테오필린 : 테오필린의 대사를 억제할 수 있다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 및 약사와 상의할 것.

이 약이 모유로 이행되는지에 관해서는 알려진 바 없으나, 이 약 복용시에는 수유를 중단하는 것이 좋다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 다형홍반이 나타날 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시한다.

- 2) 구역, 구토, 속쓰림, 설사, 상복부 또는 복부 통증 등의 위장관(창자) 장애 또는 두통 및 어지러움이 나타날 수 있다.
- 3) 드물게 발열, 발진, 전신 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 두드러기 등이 나타났다는 보고가 있다.
- 4) 가역적인 탈모증이 나타날 수 있다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 이 약 사용 전에는 반드시 임신 중이 아님을 확인한 후에 사용할 것. 임신초기 동안에 이 약의 투여를 피하기 위해서 가임연령의 여성(임신가능성 있는 여성)은 생리 첫 주 동안 또는 임신 테스트에서 음성 이 나타난 후에 치료를 시작할 것
- 2) 임상검사치에의 영향 : 때때로 가역적인 백혈구 수의 감소를 유발할 수 있고, 과도한 처방시 범혈구(전체혈구) 감소증 및 간효소치 이상을 유발 할 수 있다.
- 3) 프라지판텔이 알벤다졸 활성대사체의 혈장농도를 증가시킨다는 보고가 있다.
- 4) 과량투여 했을 경우 대증요법(증상별로 치료하는 방법)(위세척) 및 일반적인 지지 요법을 사용한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사일광을 피하여 건냉한 곳에 실온보관할 것.
- 3) 오·남용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 1정

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr> → 정보마당 → 의약품등 정보)을 참조하세요.
- ※ 본 제품 첨부문서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.arlico.co.kr)의 제품정보 또는 제품 문의처 전화(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.



충북 진천군 광혜원면 회죽리 160-17
<http://www.arlico.co.kr>

개정년월일 : 2011. 01. 13.

SI12101/04