

이론 정(독시라민속신산염)

분류번호:112

일반의약품

K G M P

적격업체

【성분·함량】 1정 중

- 유효성분 : 독시라민속신산염(USP) ----- 25mg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호 알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원 : 소, 사육부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 폴리이드성아산화 규소, 프로필렌글리콜, 히프로멜로오스

【성 상】 흰색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】 불면증의 보조치료 및 진정

【용법·용량】

성인 : 독시라민속신산염으로서 1일 1회 25mg을 반드시 수면 30분전에 경구투여한다(먹는다, 복용한다).
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 폐기종, 만성 기관지염 천식 등의 호흡장애 환자
- 2) 녹내장 환자
- 3) 전립선(전립샘) 비대 환자
- 4) 수유부
- 5) 15세 이하의 소아

6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

이미프라민계 항우울약, 항파킨슨제, 디소피라미드와 병용(함께 복용(사용))시 소변축적, 변비 등의 이상반응이 증가할 수 있으므로 주의한다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

- 1) 의사 또는 약사와 상의없이 다른 약물과 병용(함께 복용(사용))하거나 2주 이상 투여하지 않는다.
- 2) 과도한 진정이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 3) 음주 후 또는 음주 시에 이 약을 투여하지 않는다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 사람

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 때때로 항콜린작용이 나타날 수 있다.
- 2) 이 약 투여 시 졸음이 올 수 있으므로 취침 시에 투여한다.
- 3) 낮에 졸음이 나타날 경우에는 용량을 감소한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법 및 사용기간】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10 정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)