



웨스탈®

플러스형

소화불량
위부팽만
식체·과식



HANDOK

종합소화제

일반(안전상비)의약품

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

【특징】

웨스탈® 플러스는 소화를 돕는 4가지 작용을 가진 종합소화제입니다.
소화효소제 판크레아틴·탄수화물, 지방, 단백질 소화에 효과를 나타냅니다.¹
이담제 UDCA·담즙산 성분 중 하나로 이담작용을 가지며, 지방소화촉진 작용을 나타냅니다.^{1,2}
가스제거제 시메티콘·위와 장의 가스를 제거해 줍니다.¹
섬유소 소화효소제 셀룰라제

【참고문헌】

1. Sweetman, Sean, Martindale: The complete drug reference. 34th ed., Pharmaceutical Press. 2005.
2. Hardman et al. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 10th ed., McGraw-Hill. 2001.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중,

- 유효성분

판크레아틴 (EP)	315mg
셀룰라제 (KP)	10mg
우르소데옥시콜산 (JP)	10mg
시메티콘 (USP)	30mg
- 첨가제 : 규화미결정셀룰로오스, 메타규산알루민산마그네슘, 메타아크릴산·아크릴산에틸공중합체, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 시트르산트리에틸, 폴리이드성아산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 크로스포비돈, 탈크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스



【성상】

하얀색의 달걀형 장용성 필름코팅정



【효능·효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체(제함)), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감



【용법·용량】

성인 1회 1-2정, 소아(만 8세~만 15세 미만) 1회 1정
1일 3회, 식사 후 씹지 말고 복용한다.



【사용상 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 만 7세 이하의 어린이
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용상 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】 6정



【저장방법】

밀폐용기, 실온보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 유효기간 또는 사용기한이 경과 되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 본사 또는 영업소를 통해 교환하여 드립니다. 일반소비자의 경우에는 구입한 약국을 통해 교환하시기 바랍니다.

이 첨부문서의 문안작성(개정)년월일(2023.11.29)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.handok.co.kr>) 제품소개에서 제품명을 클릭하거나 전화번호 02-527-5114으로 문의 하셔서 확인하실 수 있습니다.

문안작성(개정)년월일 : 2023.11.29

【제조자】(주) 한독

충청북도 음성군 대소면 대송산단로 78

【판매자】(주) 한독

서울특별시 강남구 테헤란로 132