

다스크·요통 치료제

리락스 정 250mg

(클로르페네신카르복사이드)

다스크·요통 치료제

리락스 정 250mg

(클로르페네신카르복사이드)

전문약품

Chlorphenasin
Carbamate

Relax Tab. 250mg

분류번호: 01220

■전문약품의 분량 (1정 중)

클로르페네신카르복사이드(K.P.) 250.00mg

■성상: 흰색의 원형 정제

■효능·효과

근골격계 질환에 수반하는 통증성 근육: 요배통증, 변형성척추증, 추간판탈출증, 척추분리·전위증, 척추골다공증, 경관관절염

■용법·용량

성인: 클로르페네신카르복사이드로서 1회 250mg 1일 3회 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1)아 및 약 유사화합물(메토키카르바를 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
2)간장애 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1)간장애의 병력이 있는 환자

2)신장에 환자

3. 이상반응

1)과민증: 때때로 발진, 부종 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

2)정신신경계: 때때로 졸음, 어지러움, 드물게 두통, 두통감, 무력·연태감 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감할 또는 투여중지 등 적절한 처치를 한다.

3)소화기계: 때때로 구역·구기, 위통, 위부불쾌감, 위장장애, 식욕부진, 구갈 등의 증상이 나타날 수 있다.

4)혈액: 드물게 백혈구감소, 혈소판감소 등이 나타날 수 있다.

5)약물: 독성표피괴사증候 (lye증후군)이 나타나는 경우가 있으므로 충분히 감할하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 취해야 한다.

4. 일반적 주의

1)졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

2)장기간 투여한 경우의 안전성이 확립되어있지 않으므로 정기간 투여시에는 임상검사(혈액검사, 요검사 및 간기능검사 등)를 하는 것이 바람직하다.

5. 상호작용

다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 이러한 경우에는 투여하지 않는 것이 바람직하지만 부득이하게 병용하는 경우에는 감할하는 등 신중히 투여한다. : 패노시아진계 약물(클로르프로마진 등), 중추신경억제제(바르비탈계 약물 등), MAO저해제

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1)임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상 유익성이 위험성을 상회한다고 판단된 경우에만 투여한다.

2)수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

7. 소아에 대한 투여

유·소아에 대한 안전성이 확립되어있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감할하는 등 주의한다.

■조당단위: 30, 300정

■저장방법 및 사용기간

기밀용기, 상온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

반의 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드리겠습니다.

작성일자: 2015년 08월 11일

* 이 첨부문서 작성일자(2015년 08월 11일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.scd.co.kr)의 '제품안전성정보'에서 확인하실 수 있습니다.



제약회사

삼한당제약주식회사

경기도 고양시 광남동 제2창2길 71
대표전화: 02-950416-1100, <http://www.scd.co.kr>

제조자

신일제약(주)

충청북도 충주시 삼성동 제2창길 28