

애니탈® 정

32124BFO8

애니탈® 정

[원료약품 및 분량] 1정 중

• 유효성분

〈제1층〉 메타규산알루미늄마그네슘(KP)	40.00mg
(산화알루미늄으로서 8.22mg, 산화마그네슘으로서 3.23mg)	
탄산수소나트륨(KP)	50.00mg
침강탄산칼슘(KP)	100.00mg
〈제2층〉 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제(KP)	20.00mg
리파제(KP)	7.50mg
감초가루(생규)(글리시리진산으로서 0.5mg)	25.00mg
스코폴리아엑스(KP)	5.00mg
(히요시아민으로서 0.03mg, 총 알칼로이드로서 0.05mg)	
트리메프틴말레산염(KP)	50.00mg

• 첨가제-동물유래 : 유당수화물(소의 원유에서 유래)

• 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 카르나우바넵, 텡실드녹색(11G1810), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상]

녹색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

소화성 궤양에 따른 다음 증상의 개선 : 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식제(위제, 체함), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량

[용법·용량]

성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간(식사 때와 식사 때 사이) 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(Galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 않습니다.

2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
- 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
- 3) 부종(부기)이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본제의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 할압이 오거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에 게 상담하십시오.
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기연용(계속 사용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
- 3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.

4. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 3) 신장애(신장장애) 환자
- 4) 간장애 환자
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 6) 인산염 저하가 있는 환자
- 7) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과

[일반의약품]

민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계(두근거림), 졸음, 현훈(머지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있습니다.

6. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜하십시오.
- 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 3) 장기연용(계속 사용)을 하지 않습니다.
- 4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

7. 상호작용

- 1) 위장진통, 진경제와 병용(함께 사용) 투여하지 않습니다.
- 2) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 차이지드계 이뇨제(트리클로로메치아지드)와 병용(함께 복용(사용)) 시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 신중히 투여해야 합니다.

8. 소아·임부에 대한 투여

- 1) 이 약을 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않습니다.
- 2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
- 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

[저장방법] 차광한 기밀용기, 실온(~30℃) 보관

[포장단위] 30정/병, 1000정/병

[사용기한] 외부포장참조

[제조사] 안국약품(주) 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단 1길 40

본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다. 유통도중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 교환하여 드리오니 담당 사원을 통하여 폐사로 송부하여 주시기 바랍니다.

안국약품(주) • 소비자 상담실 : 080-001-4125

※ 이 첨부문서 작성일자(2026년 06월 08일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ahn-gook.com)에 확인할 수 있습니다. ※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 참조 ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품 안전관리원 1. 신청방법: 1644-6223 또는 14-3330 2. 신청대상: 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족 3. 보상범위: 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비