



광범위 항진균제

에코라연고

에코나졸질산염
ECONAZOLE NITRATE

일반의약품
분류번호 265

에코라연고는 새로운 광범위 피부진균(곰팡이)제로서 스위스 CILAG-CHEMIE사가 개발한 항진균(곰팡이)제입니다. 에코라연고는 인체의 대부분의 병원성 진균(곰팡이) 즉 피부사상균, 효모균, 칸디다균에 강한 진균(곰팡이)작용을 발휘하며, 그람양성균에 항균효과를 나타내므로 이로 인한 피부 혼합 감염증에도 좋은 효과를 가져오며, 또한 부작용(이상반응)도 극히 드문 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

에코나졸질산염(BP).....	10mg
보존제 : 파라옥시벤조산메틸(KP).....	1mg
보존제 : 파라옥시벤조산프로필(KP).....	1mg

【성상】 특이취가 있는 백색의 연고제
【특징】

1. 에코라연고는 흡수력이 강하여 피부의 심층에 있는 균사체의 발육을 억제합니다.
2. 에코라연고는 피부에 도포(바름)시 표피 및 진피 깊숙이 도달하여 유효농도를 지속적으로 유지하므로 백선에 대해 우수한 치료효과를 발휘합니다.
3. 에코라연고는 포도상구균(포도알균)과 같은 그람양성균에 대해서도 우수한 항균력을 발휘하므로 이로 인한 피부의 혼합 감염증에도 좋은 효과를 나타냅니다.

【효능·효과】

1. 다음의 피부진균(곰팡이)증
 - 1) 피부사상균(백선균 등)에 의한 피부질환 : 족부백선(무좀), 완선(사타구니백선), 두부백선
 - 2) 피부칸디다증
 - 3) 어루러기
2. 이 약 각구성분에 의한 피부감염

【용법·용량】

1일 1~3회 적당량을 환부(질환 부위)에 바르고 가볍게 문지른다.
증상에 따라 적절히 증감한다.
치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 않것.
 - 이 약, 이미다졸 유도체 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 습진성 피부염 환자
 - 2) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용(이상반응)
 - 1) 때때로 국소자극증상(가벼운 자극, 작열감(화끈감), 가려움, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반(붉은 반점), 통증), 피부염, 미란(긁힘), 수포, 종창(부기)이 나타날 수 있다.
 - 2) 드물게 국소자극 증상에 의해 습진을 일으킬 수 있다.
 - 3) 드물게 농포(고름물집), 구진이 나타날 수 있다.
4. 일반적주의
 - 1) 이 약으로 치료하는 동안 현저한 자극 또는 과민반응이 나타나면 투여를 중지한다.
 - 2) 이 약 치료에 반응하지 않는 난치성 칸디다증은 확인되지 않은 당뇨병의 주증상일 수 있으므로 적절한 요 또는 혈액 검사를 실시한다.
 - 3) 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 않는다.
 - 4) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신(온몸)적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(갓난아기)(표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신(온몸)적 효과가 나타날 수 있으므로 주의한다.
 - 5) 과량투여하지 않도록 주의한다.
 - 6) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균(곰팡이)학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균(항곰팡이)요법을 시행한다.
 - 7) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 않는다.
5. 상호작용
 - 이 약의 기제로 사용되는 유지성 성분은 콘돔 등의 피임용 라텍스 고무제품의 품질을 저하 또는 파

손시킬 가능성이 있으므로 가능한 한 접촉되지 않도록 주의한다.

6. 임부에 대한 투여

- 1) 마우스, 토끼, 랫트에 이 약을 경구투여한 경우에 기형발생작용이 나타나지 않았다. 그러나 사람의 피부적용량의 10~40배를 랫트에 경구투여한 연구에서 배자독성 또는 태자 독성이 나타났으며, 사람의 피부적용량의 40 또는 80배를 마우스, 토끼, 랫트에 경구투여한 다른 연구에서도 유사한 결과 나타났다.
- 2) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 3) 랫트를 대상으로 한 동물실험에서 이 약을 수유하는 랫트에 경구투여시 유즙으로 이행 되었으며 수유받은 새끼에서 이 약 또는 대사체가 검출되었다. 또한 수유하는 랫트에 대량(사람의 피부적용량의 40 또는 80배)을 경구투여한 경우에 이 랫트에 있어서 분만 후 새끼의 생존율 및 이유할 때까지의 생존율이 감소되었으며 모체독성이 나타났다는 보고가 있다.
- 4) 이 약의 모유로의 이행 여부에 대해 알려져 있지 않으므로 수유부에 이 약을 투여하지 않는다.

7. 과량투여시의 처리

- 1) 마우스, 랫트, 기니야 피그 및 개를 대상으로 한 동물실험에서 이 약을 경구투여시 LD50 값이 각각 462, 668, 272, >160 mg/kg으로 보고되었으며 사람에 대한 과량투여는 현재 까지 보고되지 않았다.
- 2) 이 약은 국소적으로만 적용해야 하나, 실수로 대량 복용한 경우에는 위세척 등의 적절한 방법을 사용한다.

8. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용한다.
- 2) 이 약은 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 않는다.

9. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 건냉암소(건조, 시원, 어두운곳)(15° 이하)보관

【포장단위】 5, 10, 50, 450, 500g

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

첨부문서 개정 연월일 : 2013. 12. 05

제조·판매자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 고객상담전화 080-300-8282
Ⓜ <http://www.taiguk.co.kr>