



광범위 지속성 항알라지제 마스질 정

(클레마스틴푸마르산염)

일반의약품
분류번호: 141

마스질정은 임상적으로 알라지성 제증상(여러 증상)의 예방 및 치료에 신속한 작용을 나타내는 지속성 항히스타민제이며, 화학적으로 Benzhydryl ether계열에 속하는 새로운 물질인 Clemastine Hydrogen Fumarate 제제로서 스위스 산도사가 개발한 새로운 항히스타민제입니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

클레마스틴푸마르산염(USP).....1.34mg

(클레마스틴으로서 1mg)

첨가제(타르색소) : 황색 4호(타르트라진)

[성 상] 미황색(연노랑)의 정제 (앞 : TG MG)

[작용·특징]

1. 신속한 항 소양작용을 나타내며 모세혈관의 투과성을 현저하게 감소시켜 삼출성 반응 및 부종(부기)을 뚜렷하게 억제시킵니다.
2. 강력하고 선택적인 히스타민 길항작용(억제작용)을 나타냅니다.
3. 성분 자체에 지속작용(10~12시간)이 있어 1일 2회의 복용으로 효과를 나타냅니다.
4. 종래의 항히스타민 제에서 볼 수 있는 졸음이 극히 드물게 발현(드러남)되며 주의력을 유지할 수 있으며 내용성이 높다.

[효능·효과] 알레르기성 비염(코염), 고초열(꽃가루 알레르기비염 (코염)) 두드러기, 소양성 피부 질환 (소양증 (가려움증), 습진·피부염), 맥관(혈관)신경성부종(부기), 코감기에 의한 재채기·콧물·기침

[용법·용량] 성인-클레마스틴으로서 1회 1mg을 아침, 저녁으로 경구투여(복용)한다.
1일 2mg을 초과해서 투여하지 않는다. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 수유부 2) 미숙아 및 1세 이하의 영아(갓난아기) 3) 이 약 또는 다른 항히스타민제에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 4) 천식 발작 등 하기도 질환 환자 5) MAO저해제(억제제)를 투여중인 환자
- 6) 전립선전립샘비대 등 하부요로 폐색(단서서 막힘) 환자(항콜린 작용에 의해 배뇨소변을 눕기 악화될 수 있다.)
- 7) 녹내장 환자(항콜린 작용에 의해 안압이 상승되어 증상이 악화될 수 있다.)
- 8) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)수화물 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음의 경우에는 신중히 투여할 것.

- 1) 협착성 소화성 궤양 또는 유문십이지장 폐색(단서서 막힘) 환자(항콜린 작용에 의해 소화관 운동이 억제되어 증상이 악화될 수 있다.)
- 2) 고혈압 환자 3) 기관지 천식의 병력이 있는 환자 4) 갑상선 기능 항진 환자
- 5) 심혈관 질환 환자 6) 다뇨(소변량 과다)증 환자 7) 간질 등의 경련성 질환 또는 그 병력이 있는 자
- 8) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용(이상반응)

- 1) 일시적인 졸음을 일으킬 수 있다.
- 2) 일반적으로 두드러기, 발진, 약진(약물 발진), 아나필락시스 쇼크(과민성 쇼크), 광선과민증, 발한(땀이 남), 오한(춥고 떨리는 증상) 등이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

- 3) 심혈관계 : 저혈압, 두통, 심계항진(두근거림), 심급박증, 기외수축(조기수축)이 나타날 수 있다.
- 4) 정신신경계 : 진정, 졸음, 어지러움, 협조장애, 피로, 혼란, 불안, 흥분, 신경질, 진전(떨림), 자극과민성, 불면증, 도착감, 이상감각, 시야몽롱, 복시(겉보임), 이명(귀울림), 급성 미로염(내이염), 히스테리, 머리무거움, 권태감이 나타날 수 있다.
- 5) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 구역, 구토, 구갈(목마름), 설사, 소화불량, 상복부통, 소화기 장애, 변비가 나타날 수 있다.
- 6) 혈액계 : 용혈성(적혈구 파괴성) 빈혈, 혈소판 감소, 무과립구증이 나타날 수 있다.
- 7) 비뇨기계 : 빈뇨, 배뇨(소변을 눕)곤란, 요저류(소변이 고임), 조기월경이 나타날 수 있다.
- 8) 호흡기계 : 기관지 분비물의 농화, 천명음(숨을 쉴때 거름) 또는 가슴의 압박감, 코막힘이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

졸음을 유발할 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

- 1) 알코올 섭취 및 중추신경 억제제(취면제, 진정제, 신경안정제 등)와의 병용(함께 복용)에 의해 상호작용을 증강시킬 수 있으므로 감량(줄임)하는 등 신중히 투여한다.
- 2) 항콜린제와 병용(함께 복용)투여할 경우 항콜린 작용이 증강될 수 있으므로 감량(줄임)하는 등 신중히 투여한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 신중히 투여한다.
- 2) 이 약은 모유중으로 이행될 수 있으므로 수유중에는 투여하지 않는다.

7. 소아에 대한 투여 - 유· 소아에서 진정 또는 수면 무호흡증, 경련, 흥분 등 중추신경증상을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.

8. 고령자(노인)에 대한 투여 - 고령자(노인)에 투여할 경우 어지러움, 진전(떨림), 저혈압 등이 자주 일어날 수 있다.

9. 과량투여시의 처리

- 1) 증상 : 중추신경의 흥분· 억제, 소아의 무력감, 아트로핀양 증상, 구갈(목마름), 홍조, 동공확대, 발열, 위장장애, 구역, 구토 등이 일어날 수 있다.
- 2) 처리 : 일반적인 약물제거법(최토, 위세척, 활성탄투여 등)에 의해 제거하거나 필요에 따라 대증요법(증상별로 치료하는 방법)을 한다.

[저장방법] 기밀용기, 간냉암소(간조, 시원, 어두운 곳)(15℃ 이하)에 저장

[포장단위] 10, 30, 100, 300, 500, 1000정

- * 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- * 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- * 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(http://www.taiguk.co.kr) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(http://drug.mfds.go.kr)을 참조하십시오.
- * 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2015. 03. 18

제조·판매자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 재작동3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282
http://www.taiguk.co.kr