

의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.



구강내 염증 치료제

아비나 파스타

트리암시놀론아세토니드

일반의약품
문류번호231

- 구강(입안)내의 염증을 치료하기 위해서는 음식물로부터의 보호, 타액(침)으로부터 보호하며 구강(입안)내의 염증을 치료하도록 일반 연고제와 다른 구강(입안)전용기제를 사용하여 소기의 목적을 달성할 수 있게 하였습니다.
- 항염증, 항알레르기 작용이 강하고 피부의 투과성이 강한 Triamcinolone Acetonide를 주원료로 하였으므로 구강(입안)내 통증의 원인인 염증을 신속하게 치료하여 줍니다.
- 잇몸, 구강(입안)내 점막등 항상 젖어있는 병소(아픈 부위)에 상용(일상적으로 사용) 할 수 있도록 특수한 기제를 사용하여 타액(침)으로부터 내려가지 않도록 환부(질환 부위)를 안전하게 보호하여 줍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중	
트리암시놀론아세토니드(KP)	1 mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	1.6 mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP)	0.4 mg

【성상】 유백색의 파스타제

【효능·효과】

다음 질환에 의한 염증의 완화 : 만성 박리(벗겨짐)성 치은염(잇몸염), 미란(긁무름) 또는 궤양을 수반하는 난치성 구내염(입안염) 및 설염(혀염)

【용법·용량】

1일 1~수회(여러 차례) 환부(질환 부위)에 적당량을 바른다. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 구강(입안)에 결핵성, 바이러스성, 기타 화농(괴음)성 감염증 환자
- 2) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
- 3) 매독 환자
- 4) 수두 환자
- 5) 진균(곰팡이)증 환자
- 6) 세균성 피부감염 환자
- 7) 입주위 피부염 환자
- 8) 주사(rosacea) 환자
- 9) 비타민 C 부족에 의한 치은염(잇몸염) 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여 할 것.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용(이상반응)

- 1) 구강(입안)
 - (1) 구강(입안)의 감염증 : 구강(입안)에 진균(곰팡이)성 및 세균성 감염증이 있을 경우에는 적절한 항진균(항곰팡이)제, 항균제 등을 병용(함께 사용)해야 하며, 증상이 속히 개선되지 않을 경우에는 투여를 중지한다.
 - (2) 구강(입안)내에 마비감 등의 경미한(가벼운) 불쾌감을 유발할 수 있다.
 - (3) 미각의 이상이나 감퇴를 유발할 수 있다.
- 2) 과민증 : 드물게 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

3) 장기투여

- (1) 하수체·부신(콩팥위샘)피질계 : 장기투여에 의해 하수체, 부신(콩팥위샘)피질계 기능을 억제할 수 있으므로 주의한다.
- (2) 피부 : 장기투여시 아토피성 피부염, 모세혈관확장증, 선(튼살)(線, Striae), 스테로이드성 여드름, 입주위 피부염, 다모증(털과다증)이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 구강(입안)내에 감염증을 수반하는 경우에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하지만 부득이 투여할 필요가 있을 경우에는 미리 적절한 항균제(전신(온몸)용), 항진균(항곰팡이)제로 치료를 하거나 또는 이들과 병용(함께 사용)투여한다.
- 2) 투여 후 바로 음식을 먹지 않는다.
- 3) 투여할 때 사용 부위에 이화감이 있을 수 있다.
- 4) 안과용으로 사용하지 않는다.

5. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으며 태아독성 또는 생식독성의 발생 가능성이 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성에 있는 부인에는 신중히 투여하고 과량 또는 장기투여는 피한다.

6. 유·소아에 대한 투여

장기투여로 인해 발육장애를 일으킬 수 있으므로 과량 또는 장기투여를 피한다.

7. 고령자(노인)에 대한 투여

고령자(노인)에게 장기간 투여하는 경우 감염증 유발, 당뇨병, 골조송증(뼈엉성증), 고혈압증, 백내장, 녹내장 등이 나타날 수 있으므로 신중히 투여한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10g

- * 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- * 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- * 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- * 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)
- ☎ 소비자상담전화 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2014. 10. 06

제조·판매자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821