

효과 빠른 정장 · 지사제

샤젠캡슐

(니푸록사지드)

일반의약품
분류번호: Q2390

샤젠 캡슐은 장질환을 유발하는 장내 병원성 세균의 발육을 억제하여 장내 세균총(세균집단)의 평형을 정상상태로 회복시켜 주는 정장 지사제입니다.
샤젠 캡슐은 혈관내에 흡수되지 않고 장관(창자)내에서만 약효를 나타내므로 전신(온몸)적인 부작용이나 독성을 나타내지 않는 지사제로서 유효성분 Nifuroxazide 200mg을 함유한 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

- 유효성분 : 니푸록사지드(KP) 200mg
- 첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 캡슐 (상 · 하 미황색), 톨크

【성상】 황색 분말이 충전된 상하 미황색(연노랑)의 경질캡슐제

【효능 · 효과】 급성 세균성 설사

【용법 · 용량】

성인 : 니푸록사지드로서 1회 200mg을 1일 4회 복용한다. 3일이상 복용하지 않는다.
복용 기간 동안 수분을 공급하고 설사의 심각도, 환자의 나이와 상태에 따라 수분의 정도와 공급방법을 조절한다.

【작용 및 특징】

- 광범위한 항균작용
샤젠 캡슐은 장질환을 일으키는 그람 음성균 및 양성균에 광범위한 항균 작용을 나타내므로 대부분의 장내 질환(설사)에 효과가 있습니다.
- 교차내성을 나타내지 않습니다.
샤젠 캡슐은 항생제와 교차내성을 나타내지 않으며 항생제 내성인 균주에도 유효합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
심하고 지속적인 설사, 구토 혹은 먹는 것을 거부하는 경우에는 정맥 수분 보충을 고려해야 한다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약의 유효성분 또는 구성성분에 과민반응이 있는 사람
2) 15세 이하의 소아
3) 이 약을 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
설사 중 생야채, 과일, 녹색채소, 매운 음식과 알린 음식 및 음료를 피하고 가능한 익힌 음식(고기, 쌀)을 섭취한다.
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 : 동물실험에서 어떠한 기형발생도 발견되지 않았다. 동물에서 이러한 효과가 없으므로 사람에서의 기형효과는 기대되지 않는다. 임상적 이용에서 임신 기간 동안 사용하였을 때 이 약의 기형성 혹은 태아독성 효과를 평가하기 위한 충분한 상관성 있는 자료는 없다. 따라서 이 약은 치료상의 유익성이 사람에 미치는 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단 되는 경우에만 주의 깊게 투여한다(현재까지 사람에서 기형을 초래하는 물질들은 잘 수행된 2종의 동물실험을 통해서 기형발생이 입증되어 왔다).
2) 수유부 : 이 약물로 단기간 치료를 받은 경우에는 수유가 가능하다.
3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 피부발진, 두드러기, 혈관부종, 아나필락시스쇼크 같은 알레르기반응이 나타날 경우
2) 치료 후 2일이 지난 후에도 설사가 지속된다면 치료를 재검토해야 하고, 경구 혹은 정맥수분보충을 고려해야 한다.
6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 설사로 인한 전해물 손실을 보상하기 위해 설탕이나 염분이 풍부한 음료로 수분을 보충해야 한다 (성인의 경우 평균 물 2L 정도).
2) 과다복용 : 이 약에 대한 과다복용 자료는 없다. 이 약을 과다복용하였을 경우, 환자의 증세를 잘 관찰하며 대증요법(증상별로 치료하는 방법)을 수행해야 한다.
3) 침습의 임상증상을 수반하는 감염성 설사의 경우 일반적으로 항생물질투여를 고려한다.
4) 이 약물은 운전 또는 기계조작을 하는데 영향을 주지 않는다.
7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10캡슐/PTP

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
※ 사용기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
※ 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)→(의약품 검색)을 참조하십시오.
※ 부작용보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 08. 30

제조사
JS제이에스제약(주)
전남 장성군 황룡면 강변로 484-28
☎ 소비자상담전화 061-394-5530

판매자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길123

SZC01-E01-02