

소롤

(소브레롤) 캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

소브레롤(KP) 200mg

첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호

【성상】

흰색 분말이 든 상부 녹색, 하부 흰색의 캡슐제(TG SR200)

【효능·효과】

분비기능이 항진된 급·만성 호흡기 장애 : 급·만성기관지염, 호흡장애(천식, 기침)를 수반한 기관지염, 비인두염, 후두기관염

【용법·용량】

성인 : 소브레롤로서 1회 200 mg(1캡슐) 1일 2회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)수화물분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임부 : 기형발생은 없으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
- 2) 수유부

3. 다음과 같을 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 드물게 전신(온몸)적 알레르기증상(피부발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 작열감(화끈감)) 및 국소반응

4. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항

항생물질, 기관지확장제, 천식치료제, 폐결핵치료제와 함께 복용할 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이가 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사일광(햇빛)을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10캡슐 / PTP, 500캡슐 / 병

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조사

 **태극제약(주)**

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

☎ 소비자상담전화 080-300-8282

Ⓜ <http://www.taiguk.co.kr>

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 01. 26