



기미 · 주근깨 · 검은반점

도미나 크림

(히드로퀴논)

일반의약품
분류번호 : 269

<도미나크림의 특징>

도미나크림은 멜라닌색소의 생성단계에서 억제하고 동시에 과다하게 생성된 멜라닌색소를 제거해 주는 복합작용으로 멜라닌색소의 과다 침착증으로 인한 각종 증상(기미, 주근깨, 노인성 검은반점 등 기타 불필요한 부위의 색소침착증)을 보다 빠르고 확실하게 치료해 줍니다.

새로운 고급기제로 조제된 도미나크림은 기미 · 주근깨의 치료효과에 탁월한 히드로퀴논4%에 치마버섯의 균사체로 만든 베타글루칸과 알로에베라겔, 토코페롤, 스쿠알란, 비타민 C 등을 첨가하여 더욱 빠르게 피부보호 기능을 대폭 강화한 새로운 개념의 기미 · 주근깨 치료제입니다.

<기미 · 주근깨의 치료>

자외선(햇빛)의 과다노출을 피하고, 과일이나 야채 등 비타민, 미네랄이 풍부한 음식을 충분히 섭취하고 충분한 수면과 건강한 생활로 예방하는 것이 가장 좋은 방법이지만, 일단 생성된 기미 · 주근깨는 위와 같은 예방법과 병행하여 도미나크림을 적절히 사용하여 8주이상 꾸준히 치료하시는 것이 좋습니다.

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

- 유효성분 : 히드로퀴논(USP) 40mg
- 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) 1mg
파라옥시벤조산프로필(KP) 1mg
- 기타 첨가제 : 라우릴황산나트륨, 미네랄오일, 라놀린알코올, 백납, 베타글루칸 0.3% 액, 세탄올, 소르비탄 스테아레이트, 스쿠알란, 스킨케어 4263, 아스코르브산팔미테이트, 알로에베라겔, 에데트산 나트륨수화물, 옥틸도데카놀, 유동파라핀, 정제수, 콜레스테롤, 토코페롤아세테이트, 파라핀, 폴리소르베이트 60, 폴리에틸렌글리콜 400, 폴리에틸렌글리콜 4000, 폴리옥시에틸렌세틸 에테르, 프로필렌글리콜, 피로아황산나트륨

[성 상] 유백색 크림

[효능 · 효과]

다음과 같은 과도한 색소 침착 피부의 점차적인 표백 : 간반, 흑피증(기미), 주근깨, 노인성 검은반점, 기타 불필요한 부위의 과도한 멜라닌 색소 침착

[용법 · 용량] 히드로퀴논으로서 4%로 1일 1회(취침 전) 환부(질환 부위)에 바른다.

[저장 방법] 기밀용기에 넣어 30℃이하 건냉소(건조하고 시원한 곳) 보관

[포장 단 위] 60g/병, 120g/튜브, 450g/병

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

- * 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- * 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- * 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품 도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- * 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 09. 20

제조사
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-6282
Ⓜ <http://www.taiguk.co.kr>

[사용상의 주의사항]

1. 경고

- 1) 이 약 사용시 햇빛에 대한 노출을 차단시키는 것이 무엇보다 중요하다. 심지어 최소한도의 햇빛 노출에 의해 멜라닌 생성작용이 지속될 수 있다. 이 약을 사용중 또는 사용후에는 표백된 피부를 보호하고 재발을 방지하기 위하여 적응부위가 햇빛에 노출되지 않도록 특히 주의하며, 자외선 차단제를 사용하거나 햇빛으로 부터 보호하는 의복을 착용한다. 이 약의 적응부위가 햇빛에 노출된 후 피부가 변색되는 등의 부작용 사례가 보고된 바 있다.
- 2) 동물실험(고용량 경구투여)에서 히드로퀴논에 의한 변이원성 및 발암성이 관찰되었으므로 치료 효과에 따라 투여기간을 적절히 조절하고 장기간 사용하지 않는다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력 또는 알레르기 반응의 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 신장에(신장장애) 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 2) 수유부

4. 이상반응

때때로 접촉피부염과 같은 과민반응이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 일반적주의

- 1) 이 약 사용 전에 피부에 소량을 바르고 24시간 관찰하여 피부과민반응을 테스트한다. 경미한(가벼운) 발적(충혈되어 붉어짐)에는 사용이 가능하지만 가려움, 수포, 과도한 염증이 나타날 경우에는 사용하지 않는다.
- 2) 2개월 정도 사용 후에도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우에는 사용을 중지한다.
- 3) 이 약은 피부탈색에만 사용하며 태양광선 차단 및 일광화상(햇볕화상)의 예방목적으로는 사용하지 않는다.
- 4) 이 약을 복용한 경우 의사 또는 약사와 상의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는다(안전성이 확립되어 있지 않다).
- 2) 이 약이 흡수되어 유즙으로의 분비 여부에 대해 알려지지 않았으나, 수유부에는 신중히 투여한다.

7. 소아에 대한 투여

12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다(안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다).

8. 광량투여시의 처리

이 약의 국소(부분) 투여로 인한 전신(온몸)작용은 보고 되지 않았으나 이 약물은 흡수가 명확하지 않고, 일부환자에서 이 약과의 관련성을 배제할 수 없는 일시적인 피부발적(충혈되어 붉어짐) 및 가벼운 작열감(화끈감)이 나타났으므로, 적응부위를 좁게 제한한다(적응부위가 전체 피부의 10%를 초과하지 않도록 한다).

9. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용한다.
- 2) 눈 및 점막에 닿지 않도록 주의한다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

11. 기타

5% 히드로퀴논 크림의 만성적 사용(8년 정도)으로 조직흑변(검게 변함)증, 콜로이드성 비립종의 발현(드러냄)이 보고되었다.