



잇몸 염증 치료제

캡슐

일반의약품
분류번호 : 231

아로마 · 에스

치은염(잇몸염)은 치주(치아주위조직)가 붓게부어 출혈이 오고 병이 진행됨에 따라 누런 고름이 생깁니다. 조금더 진행되면 치태가 생기고 입냄새가 심하여 지는데 이러한 증상을 치조(이틀)농루라합니다. 아로마에스캡슐은 연골내의 골(뼈)형성, 상아질의 결손으로 인한 피하(피부밑) 점막출혈, 치육(잇몸)의 중앙의 생성억제에 관여하는 비타민 C, 말초혈관혈행을 촉진시켜 염증을 개선시켜주는 토코페롤아세테이트, 부종(부기) 및 염증을 완화시켜주며 강력한 소염(항염) 작용이 있는 염화리소짐, 궤양치료작용 및 입냄새 제거작용이 있는 클로로필린구리나트륨착염을 이차적으로 배합한 잇몸 염증 치료제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

클로로필린 구리나트륨착염(KPC).....20mg
염화리소짐(KPC).....30mg
제피형 아스코르브산 96% Type SC(별 규)..... 156.25mg
(아스코르브산으로서 150mg)
건조토코페롤 아세테이트 50%(별 규)..... 60mg
(토코페롤아세테이트로서 30I.U)
첨가제(타르색소) : 황색 203호, 청색 1호

【성 상】

회녹색 분말이 든 상하 녹색의 경질 캡슐제(TG ARM-S)

【효능 · 효과】

치은염(잇몸염), 치조(이틀)농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 출혈, 고름 등)의 완화

※ 치은염(잇몸염)이란?

【원 인】

양치질이 불충분하여 입안이 불결하거나 잇몸 근처에 붙은 치구, 치석의 자극에 의하여 생기는 만성적 염증입니다. 또 비타민-씨 부족, 당뇨병, 백혈병, 무카탈리 여제혈액증의 경우에도 잇몸염이 생깁니다. 잇몸염은 치조(이틀)농루의 초기증상일 수 있으므로 주의해서 초기에 치료하여야 합니다.

【증 상】

이와 접촉하는 잇몸부위가 붉게 충혈되어 출혈되기 쉬워지고 심하면 출혈이 심하여지고 부으며 통증이 생깁니다.

※ 치조(이틀)농루란?

【원 인】

국소적인 원인과 전신(온몸)적인 원인이 병합되어 치조(이틀)농루를 일으킨다.

- 1) 국소적인 원인은 치석, 치구에 의한 만성염증, 음식을 찌꺼기가 함께 끼여있는 경우 이의 맛물림이 이상이 있는 경우, 기타 좋지 않은 습관등이 있다.
- 2) 전신(온몸)적인 원인으로는 당뇨병, 비타민 결핍(비타민-씨), 내분비이상, 자율신경실조, 전염성 질환 등이 있다.

【증 상】

잇몸, 치조(이틀)굴(뼈), 치아뿌리막등을 받치고 있는 치조(이틀)조직에 나타나는 만성염증을 말하며 초기증상은 잇몸염과 같지만 일단 깊은 치육(잇몸)낭이 형성되어 염증이 치조(이틀)조직에 미치게되면 다음과 같은 특징적 증상이 생긴다.

- 1) 잇몸의 충혈이 심해져서 조금만 눌러도 충혈이 된다.
- 2) 치육(잇몸)낭의 깊이가 정상(1mm 정도)의 2배 이상이 되어 누르면 누런 고름이 생긴다.
- 3) 엑스-선 사진으로 보면 치수굴(치아속질뼈)이 거의 흡수되어 없어져서 이가 흔들린다.
- 4) 입속이 끈끈해지며 냄새가 심하게 난다.
- 5) 잇몸의 화농(괴름)이 되풀이 되며 그때마다 이의 동요가 심해지고 잇몸이 내려앉아 치아속질부분이 노출된다.
- 6) 방치하여 두면 음식물을 전혀 씹을 수가 없게 되어 이가 자절로 빠집니다.

【용법 · 용량】

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 난백(달걀흰자) 알레르기 환자
 - 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 복용할 것.
 - 1) 아토피피부염, 기관지천식, 약물 알레르기, 식물 알레르기 등의 알레르기성 소인이 있는 환자.
 - 2) 양친 형제 등이 알레르기 증상의 병력이 있는 환자.
 - 3) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들어 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)의 병력이 있는 사람.
3. 부작용
 - 1) 속(소크) : 드물게 속(소크)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 안면(얼굴)창백, 사지냉감(팔다리 찬느낌), 혈압강하, 청색증, 의식불명 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절히 처치한다.
 - 2) 과민증 : 때때로 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 복용을 중지한다.
 - 3) 소화기계 : 설사, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 드물게 구내염(입안염) 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성 표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반(붉은 반점), 가려움, 안(눈)충혈, 구내염(입안염)등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 화상양(불에 덴 듯한 모양)의 수종 등의 중증(심한 증상)의 증상이 전신(온몸)의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증(심한 증상)의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

【저장방법】 차광한 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 24, 48, 60, 96, 120, 500캡슐

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기간이 경과되었거나, 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 가까운 약국에서 구입하세요.

* 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 사용 전에 반드시 설명서를 읽고, 사용 후에는 제품과 함께 보관해 주십시오.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.

* 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → [정보마당] → [의약품등 정보]를 참조하십시오.

* 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려 주십시오.

첨부문서 개정년월일 : 2012. 01. 05



제조 · 판매자

태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 상신리 907-4

☎고객상담전화 080-300-8282

🌐 <http://www.taiguk.co.kr>