

바스칼 캡슐은 해열, 진통작용이 우수하고 부작용이 적은 비피린계 약물인 아세트아미노펜, 항히스타민제인 클로르페니라민말레산염, 속효성진해제인 노스카핀, 기관지확장제인 디메틸에페드린염산염, 대뇌피질에 작용하여 두통을 경감시키는 카페인무수물이 첨가된 종합감기약처방에 해열, 강심, 진정 및 거담(가래)작용이 있어 열성질환에 널리 사용되어온 우황과 해열, 진정, 항균작용이 우수한 해표제인 육계, 기관지점액분비 증가작용으로 인한 거담(가래) 및 소염(항염)작용이 우수한 원지등의 3가지 생약성분이 보강되어 감기로 인한 제증상(여러 증상)을 신속히 경감, 제거시켜주므로 코감기, 목감기, 몸살감기까지 광범위한 효과를 나타내는 새로운 처방의 속효성 종합감기약입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

우황(KP)	0.5mg
동물유래 : 우황 (기원 : 소, 사용 : 담낭중에 생긴 결석) (결합형빌리루빈으로서 0.1mg)	
원지가루(KPC)	33.3mg
육계가루(KPC)	25mg
(계피산으로서 7.5mg)	
아세트아미노펜(KP)	150mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
노스카핀(KP)	8mg
디메틸에페드린염산염(KP)	10mg
카페인무수물(KP)	12.5mg
첨가제(타르색소) : 적색3호, 황색5호, 황색203호	

【성 상】 미갈색의 분말을 함유한 상 : 주황색 / 하 : 미황색(연노랑)의 경질캡슐제 (TG BSC)

【효능·효과】

감기의 제증상(여러 증상) (콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화.

【용법 용량】

성인 1회 2캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용한다. 어린이 (7~14세) : 1회 1캡슐 복용.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이약이나 다른 해열진통제를 복용해야할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하지 말 것

- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인.
- 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
- 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람.
- 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것

- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의한 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심이 되는 소·유아 및 어린이(14세 이하)
- 간장, 신장(콩팥), 갑상선 질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람.
- 심장에 장애가 있는 사람, 또는 고령자(노인).
- 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨(소변을 놓)곤란이 있는 사람.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부.
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

5. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것

- 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 다음 약물과는 동시에 복용하지 말 것.
진해(기침을 그치게 함) 거담약(가래약), 다른감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등
- 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것.
- 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세미만의 유아에는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.

6. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것

- 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨(소변을 놓)곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것.
- 수회(여러 차례)복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것.
- 장기 연용(계속 사용)하지 말 것.
- 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 이 약의 복용후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고 수족(손 발)이 차가워지고 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우.
 - 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신(온몸)피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - 천식이 나타난 경우
- 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량 투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

7. 보관 및 취급상의 주의

- 소아의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 6, 10, 12, 100, 300캡슐

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

* 사용전에 설명서를 반드시 주의 깊게 읽고, 설명서를 제품과 함께 보관하십시오.

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환해드립니다. 가까운 약국에서 구입하세요.

* 의약품용 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

* 사용(유효)기간이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.

* 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → [정보마당] → [의약품등정보]를 참조 하십시오.

* 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭 → 보고마당 → 안전성 정보 → 의약품 유해사례보고)에 알려 주십시오.

첨부분서 개정년월일 : 2012. 02. 03

제조·판매자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 상신리 907-4
☎ 고객상담전화 080-300-8282
🌐 <http://www.taiguk.co.kr>