



위·십이지장궤양, 위염, 속쓰림에-

파티겔 현탁액

(알마게이트)

일반의약품
분류번호:234

【원료약품 및 그 분량】 1포(15mL)중

- 유효성분 : 알마게이트(KP).....1.5g
- 첨가제(보조제) : 클로르헥시딘아세트산염(BP).....2.7mg
- 기타 첨가제 : 박하향 #37-FN, 백당, 수산화나트륨, 에탄올, 정제수, 한천, 히드록시에틸셀룰로오스, D-소르비톨 액70%

【성상】 흰색의 현탁제

【효능·효과】

다음 질환의 재산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】

성인 및 12세 이상의 소아 : 알마게이트로서 1회 1.5g(1포)을 1일 3회, 식후 30분~1시간에 경구(먹는) 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자
- 2) 알츠하이머병 환자
- 3) 치질 환자
- 4) 체액 저류(부기) 환자
- 5) 임신 중독증 환자
- 6) 설사 환자
- 7) 진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

테트라사이클린계 항생물질(항체 복용시 흡수를 억제할 수 있음)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.
- (1) 비스테로이드 소염(항염)진통제(NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제 : 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2~3 시간 간격을 두고 복용한다.
- (2) 살리실산염 : 신장(콩팥)의 배설을 증가시킨다.
- 2) 신장에(신장장애) 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장에(신장장애) 환자에게는 권고되지 않는다.
- 3) 신제 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염함량

감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음.

4) 고령자(노인)

5) 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사
- 2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 15mL(1포)X100포

【사용(유효)기간】 제조일로부터 24개월

* 흔들어 복용하십시오 *

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변해·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품사건(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 09. 27

제조·판매자



경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

☎ 소비자상담전화 080-300-8282

☎ <http://www.taiguk.co.kr>