

네오시덤 연고

퓨시드산나트륨

네오시덤연고는 살균력이 강력하고 조직침투력이 우수한 새로운 항생제입니다.
네오시덤연고는 다른 항생제와는 달리 steroid와 유사한 구조를 가지고 있으므로 steroid처럼 조직 친화력이 좋아서 병소(아픈부위)에 고농도로 침투하여, 깊은 부위의 염증도 경구(먹는) 항생제를 병용(함께 사용) 투여하지 않고 효과적으로 치료할 수 있습니다. 또한 **네오시덤연고**는 오랫동안의 임상결과, 치료에 지장을 줄 만한 부작용이나 피부과민 반응을 나타내지 않았고, 특이한 화학구조를 지니고 있어 다른 항생제 연고가 듣지 않는 경우에도 효과가 좋은 항생제 연고입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중
유효성분 : 퓨시드산나트륨(KP)..... 20mg(역가)
기타첨가제 : 백납, 백색바셀린, 세탄올, 스테아릴알코올, 유동파라핀

【성상】 무색 또는 연한 노란색의 연고제

【효능·효과】 1) 유효균종 : 포도구균, 연쇄구균, 코리네박테륨, 클로스트리듐
2) 적응증 : 농피증(고름피부증)·농가진(고름딱지증), 감염성습진양피부염, 심상성여드름(보통여드름), 모낭염, 종기 및 종기증, 화농(끓음)성한선염, 농가진(고름딱지증)성습진, 화상·외상(상처)·봉합(꿰매)창·식파창(피부 이식후 생긴 상처)에 의한 2차 감염

【용법·용량】 환부(질한 부위)를 깨끗이 하고 1일 1~2회 적당량을 환부(질한 부위)에 직접 바르거나 무균거즈에 넓게 펴발라 붙인다.
두꺼운 층에는 적용을 피하며 보통 1주 정도로 투여기간을 제한한다.

【약리작용】

1. 네오시덤 연고는 치료효과가 우수하고 신속합니다.
네오시덤 연고는 피부감염증의 주원인균인 황색포도상구균(포도알 균)과 연쇄상구균을 저농도에서 사멸시켜 높은 치료효과를 나타낼 뿐만 아니라 특이한 화학구조를 갖고 있으므로 다른 항생제와 교차내성이 없어 타제(다른 약)로 치료에 실패한 화농(끓음)성 피부질환에도 치료효과가 우수하며 작용이 신속합니다.
2. 네오시덤 연고는 조직침투력이 강력합니다.
네오시덤 연고는 steroid와 유사한 구조를 지닌 약물로서 항생물질중 침투력이 높아 병소(아픈 부위)에 고농도로 침투할 수 있기 때문에 난치성·심재성(드러나지 않는) 피부감염증에도 효과적으로 사용할 수 있으며, 파괴된 피부조직의 재생을 촉진시키는 작용을 가지고 있어서 각종 피부감염증에 높은 치료효과를 나타냅니다.
3. 네오시덤 연고는 내약성(약에 대한 내성)이 강합니다.
네오시덤 연고는 10여년에 걸친 임상에서 독성 증상이 거의 나타나지 않았고, 투약에 문제가 될 만한 부작용도 없었습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
1) 퓨시드산 및 그의 염에 과민반응의 병력이 있는 환자
2) 비감수성균(특히 녹농(푸른 고름)균)에 의한 감염환자
2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현(드러냄) 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
- 2) 감작(과민상태로 만들)될 수 있으므로 충분히 관찰하고 감작(과민상태로 만들)된 증후(가려움, 발적(충혈되어 붉어짐), 종창(부기), 구진, 소수포(물집) 등)가 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 이 약은 높은 투과흡수성을 가지므로 장기간 또는 광범위한 표면에 투여하지 않도록 주의한다.
- 4) 국소사용 시 내성균이 발현(드러냄)되면 추후 동일한 항생물질을 경구투여 시 해로울 수 있다. 그러나 대체로 내성균은 단시간내 다시 이 약에 대해 감수성을 갖게 된다.
- 5) 반복 투여 및 장기연용(계속 사용)으로 인해 비감수성균이 과잉증식할 수 있다. 만일 균교대증이 발생하면 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 6) 안과용으로 사용하지 않는다.
- 7) 눈 또는 눈꺼풀과 같은 얼굴 안쪽에 사용하는 것은 적합하지 않다.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 임부 및 임신가능한 여성에게 투여 시 이 약은 전신(온몸)투여 시 태반관문을 통과한다는 보고가 있으므로 국소사용 시 치료 상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
2) 수유부가 유방감염에 이 약을 사용할 경우 신생아에게 흡수될 수 있다.
3) 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않고 전신(온몸)투여 시 유즙으로의 이행이 보고되었으나 국소사용 시 상용(일상적으로 사용)량에서는 영아(갓난아기)에 영향을 미치지 않는다.
4) 미숙아 및 신생아는 간기능이 미숙하므로 장기간 또는 광범위한 표면에 투여할 경우에는 간기능 장애가 나타날 수 있으므로 주의한다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
일시적인 작열감(화끈감) 때때로 발진, 약한 동통(통증) 및 자극 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 또한 중증(심한 증상)의 다리궤양 환자에 적용시 통증이 유발될 수 있다.
5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 5g, 10g, 50g / 튜브, 400g, 450g / 병

※본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
※사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
※이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
※자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
※부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
☎소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 09. 11