

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중

- 유효성분 : 플루벤다졸(BP).....3.33g
- 첨가제(보존제) : 벤조산나트륨(KP).....0.06g
- 기타 첨가제 : 농글리세린, 바나나에센스, 스테비올배당체, 시트르산수화물, 잔탄검, 정제수, 폴리소르베이트 80, D-소르비톨액

【성상】 바나나향이 나는 백색~미황색(연노랑)의 현탁성 시럽제

【효능·효과】 회충, 요충, 편충, 십이지장충의 감염 및 이들 혼합감염의 치료

【용법·용량】 성인 및 소아 : 플루벤다졸로서 15mL(1포)를 단회(1회) 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약 구성 성분에 과민반응 환자
 - 2) 임부
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 1세 미만의 영아(갓난아기)(적절한 대조시험이 행해진 바 없으므로, 기생충 감염이 영양상태나 신체발육을 저해(억제)하는 경우에 한하여 투여한다.)
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(랫트를 사용한 한 시험에서 태자독성 및 기형발생 작용이 관찰되었다. 그러나 여타의 랫트에 대한 시험이나 마우스, 토끼를 사용한 기형형성 시험에서는 별다른 변화가 관찰되지 않았다. 사람에 대한 사용에서는 이 약이 기형발생의 위험성을 증가시키지는 않았다.)
 - 3) 수유부(이 약이 모유로 이행되는지에 관해서는 알려진 바가 없으나, 수유를 중단하는 것이 바람직하다.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 기생충의 대량감염시 또는 기생충의 배출 시 일과성(한번 나타나고 없어지는) 구역, 복통(배아픔), 설사가 드물게 보고되었다.
 - 2) 드물게 발진, 두드러기, 혈관부종(혈관부기)과 같은 과민반응이 관찰되었다.
 - 3) 과량복용 시에는 복부(배부분)경련, 구역, 구토 및 설사가 나타날 수 있다. 이 약에서 권장되는 최장치료기간은 3일이나 드물게 포충질환 치료를 위해 장기간 대량 투여한 환자에서 가역적인 간기능장애, 간염, 혈액이상이 보고되었다. 특별한 해독제는 없으며 필요에 따라 20mg/100mL의 과망간산칼륨 수용액으로 위세척하거나 활성탄을 투여한다.
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사일광(햇빛)을 피하여 건냉한 곳(건조하고 시원한 곳)에 실온보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 15mL(1포)×4포, 50포, 100포

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.

※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ **흔들어 복용하십시오.**

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 09. 14

제조사
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282