

비마약성 기침약 투 렌 정 (벤프로페린인산염)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 벤프로페린인산염(KP)26.33mg
(벤프로페린으로서20mg)
- 첨가제(타르색소) : 적색 3호, 적색 40호
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 전분글리콜산 나트륨, 톨크, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스 2910

【성 상】 적색 원형의 필름코팅정 (앞 : TG N)

【효능·효과】

주효능 효과
다음 질환에서의 기침 : 감기, 급·만성기관지염, 상기도염(인·후두염), 폐결핵

【용법·용량】

성인 : 벤프로페린으로서 1회 20~40mg(1~2정) 1일 3회 경구투여(복용)한다.
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당(젓당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젓당)수화물분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용(이상반응)

- 1) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 피로, 불쾌감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 복통(배아픔), 위부(상복부)불쾌감, 가슴쓰림, 구갈(목 마름) 등이 나타날 수 있다.
- 3) 과민증 : 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

3. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

4. 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의한다.

5. 적용상의 주의

정제를 구강(입안)내에서 씹으면 구강(입안)점막에 마취효과를 나타낼 수 있으므로 그대로 삼킨다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10정 / PTP, 1000정 / 병

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 08. 30

제조·판매자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282