

탄산칼슘정

(침강탄산칼슘)

일반의약품
분류번호: 234

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

■ 유효성분 : 침강탄산칼슘(KP).....500mg

■ 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 포비돈 K30

【성상】 흰색의 원형정제 (앞 : TG CCT)

【효능·효과】

주요 효능·효과

1) 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다

2) 칼슘보급

【용법·용량】

성인

1) 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 탄산칼슘으로서 1일 1~5g(2~10정)을 3~4회 분할 경구투여(복용)한다.

2) 칼슘보급 : 1일 1.5~3g(3~6정)을 1~2회 분할 경구투여(복용)한다.

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

1일 최대 용량 7.5g을 초과하지 않도록 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 중증(심한 증상) 고칼슘혈증 환자 및 중증(심한 증상) 고칼슘뇨증 환자

2) 부갑상선기능항진증 또는 갑상선기능저하증 환자

3) 중증(심한 증상) 신부전 환자

4) 무산증 또는 위산 결핍증 환자.

5) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)수화물분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 신장장애(신장장애) 환자

2) 심기능장애, 폐기능장애 환자

3) 변비환자

4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

4. 부작용(이상반응)

1) 소화기계 : 이 약을 투여하는 동안 구역, 변비 또는 설사가 나타날 수 있고 드물게 위산의 반동성 분비등이 나타날 수 있다.

2) 대사이상 : 고용량 복용에 의해 고칼슘혈증, 알칼리증이 나타날 수 있다.

3) 장기·대량투여 : 신결석, 요로결석이 나타날 수 있다.

4) 과민증 : 가려움증이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.

2) 소아에 투여시킬 때에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.

3) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

6. 상호작용

1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용(함께 복용)투여하지 않는다.

2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내·체액의 pH상승에 의해 병용(함께 복용)약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.

3) 다량의 우유와 병용(함께 복용)시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

4) 비타민D, 치아잇게 이노계와 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증이 나타날 수 있으므로 주의 한다.

7. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선(햇빛)을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 90정/병, 500정/병

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.

※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 10. 10



제조·판매자
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

☎ 소비자상담전화 080-300-8282