

500정
조제용

보나링®에이정

구역·구토·멀미 용제
디멘히드리네이트

K G M P
일반 의약품
P2301-14

【성상】 흰색의 정방형 정제

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정(290mg)중 유효성분 : 디멘히드리네이트(KP) 50mg

· 첨가제(등물유래) : 유당수화물(건강한 소의 우유),
· 기타첨가제 : 유당수화물, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 말크 스테아르산마그네슘

【효능·효과】 1) 멀미, 메니에르증후군, 방사선수치에 의한 구역, 구토, 어지러움, 과수술후 구역·구토

【용법·용량】 성인 : 디멘히드리네이트로서 1회 50mg, 1일 3~4회 경구투여 한다(만년다, 복용한다). 예방목적으로는 30분~1시간전에 50~100mg을 투여한다. 환각적으로 1일 200mg을 초과하지 않는다. 연령나이에, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【포장·단위】 500정정 (저장방법) 밀폐용기 실온(1~30℃) 보관

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입 시 사 용기간이 경과되었거나 변질·변색·오염되거나 손상된 제품은 약 국·가설사 또는 약품의 판매처에 한하여 교환하여 드려며, 공정거래 위원회에서 고시한 “소비자 분쟁 해결 기준”에 의거, 정당한 소비 자피해에 대해 보상해드립니다. ※ 최종 개정일(월) 2022.12.29 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 약품통합정보시스템 (<https://nchug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※ 약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다. ※ 부작용 보고 및 폐해 구제신청 : 한국약품안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)

■ **사용상의 주의사항** : 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오 1) MAO저해제(약제)를 투여받고 있는 환자 2) 디페닐메탄계 약물(디멘히드리네이트, 염산페클로진, 염산부클리진에 대해 과민증인 환자) 3) 전립선전립선비대 등 배뇨(소변)을 능징에 환자 4) 협우(경 복)장 환자 5) 간질환자 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하면 안 됩니다. 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오 1) 소화 및 간질, 갑상선기능항진증 또는 급성 신염신 정염 환자(이 약 성분 중 테오필린계 약물의 부작용이 나타날 수 있습니다) 2) 미추(미추후) 개어는 것이 지연될 수 있습니다) 3. 부작용 1) 정신장애 : 졸음, 두통, 두중감(머리 무거움), 수족발바비, 손가락진전(떨림), 어지러움, 시력불선명 등의 시각장애, 불면, 자각이상 등이 나타날 수 있습니다. 2) 과민증, 발진, 광과민증 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오. 3) 소화기계 : 때 때로 가슴쓰림, 위통 등이 나타날 수 있습니다. 4) 비뇨기계 : 배뇨(소변)을 능징에 나타날 수 있습니다. 5) 기타 : 구갈(목마름증), 피로감이 나타날 수 있습니다. 4. 일반적 주의 이 약을 투여중인 환자는 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하여야 합니다. 5. 상호작용 1) 브리비탈계 약물, 마취제 등의 중추신경억제제의 병용(합복용) 또는 음주에 의해 상호작용이 증가될 수 있으므로 감량(줄임)하는 등 신중히 투여하십시오. 2) 제8뇌신경 장애를 일으킬 수 있는 아미노글리코사이드계 항생물질(스트렙토마이신, 카나마이신 등에 의한 난청(귀먹음)을 은폐하는 경우가 있으므로 충분히 관찰하고 신중히 투여하십시오. 3) 아트로핀 및 아트로핀계 약물과 병용(합복용)투여시 요추(소변)이 고임, 변비, 구갈(목마름증)등 아트로핀의 부작용이 증가할 수 있습니다. 6. 임부에 대한 투여 유사화합물의 동물실험(랫트)에서 기형발생이 보고되었으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(우울)다(판단)되는 경우에만 투여하십시오. 7. 수유부에 대한 투여 수유중의 투여에 대한 안전성을 확립되지 않았으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회(우울)다(판단)되는 경우에만 투여하십시오. 8. 고령자(노인)에 대한 투여 일반적으로 고령자(노인)는 생리(기능)이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등의 주의를 요함다. 9. 과량투여시(치) 과량투여시(경) 경, 흉부, 환기(기) 나타날 수 있으며, 이러한 경우에는 항경련제를 근육 또는 정맥주사하거나 위식(적)을 하도록 함다.



제조판매처
일양약품주식회사
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소재지상당실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상당실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제조번호 :

사용기한 :